

Actualité Tournesol

Graminées et conditions sèches

BASF
The Chemical Company

Si le désherbage en prélevée n'a pas donné toute satisfaction, il reste 2 solutions pour contrôler les graminées dans votre tournesol :

- *PULSAR®*, qui peut se faire si la variété implantée correspond à la technologie *CLEARFIELD®*.
- *Un Anti-graminée spécifique performant comme STRATOS®+DASH®* nous vous en rappelons ci-dessous les préconisations.



Préconisations en fonction du stade des graminées

Stratos + Dash HC			
Graminées annuelles	1 à 3 feuilles	0,8 + 0,8 *
	3 feuilles à début tallage	1 + 1
	Tallage à montaison	1,2 + 1,2
Vivaces	Pousses 10 à 20 cm	2 + 2

* dans le cas d'une application précoce, un 2^{ème} passage s'avérera parfois nécessaire / relevées

® : marques déposées BASF - **Stratos® Ultra** : Autorisation de vente : n° 9000490 - Composition : 100g/l cycloxydime. Formulation : EC -Doses et usages autorisés : 2 L/ha contre les graminées annuelles, 4L/ha contre les graminées vivaces (sauf épinal) sur de nombreuses cultures, se reporter à l'étiquette. Classement toxicologique : Xi : Irritant ; R38 : Irritant pour la peau , R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion, R67 : L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges. R52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Délay avant récolte : pas de DAR sur Tournesol. Pour les autres cultures, se reporter à l'étiquette. Distance aux points d'eau : Respecter une zone non traitée minimale de 5 mètres (arrêté du 21/09/2006) Délay de rentrée dans la parcelle : 24 heures. **Dash® HC** : Autorisation de vente n° 9400478 - Composition et formulation : - -Dash® HC : 22,5% ester de phosphate d'alcool gras polyoxyalkylés, 37,5% esters méthyliques d'acide gras, 5% acide oléique en formulation liquide. Doses et usages autorisés : - Dash® HC : 2 L/ha, adjitant pour bouillie herbicide - Classement toxicologique : Xi : Irritant , R38 : Irritant pour la peau -Préparation de la bouillie : verser Dash® HC en premier. Avec un bac incorporateur, verser Dash® HC dans le bac vide sans ajouter d'eau, aspirer le produit, puis rincer le bac incorporateur à grande eau. **PULSAR®40** - Autorisation de vente: n°2090064 -Formulation: SL - Composition: 40 g/l d'imazamox - Usages et doses autorisées: tournesol CLEARFIELD® (variétés tolérantes à l'imazamox) 1,25 L/ha. Nombre d'apport maximum : 1 - Classement toxicologique: N : dangereux pour l'environnement aquatique, R50/53 : très toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Délay avant récolte (DAR): tournesol :90 jours - Distance aux points d'eau: respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 mètres - Délay de rentrée dans la culture: 6 heures après le traitement - Protection utilisateur lors de la manipulation produit: gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ouP5, vêtement de travail de niveau de protection 4.