

INFO BETTERAVES

Le désherbage de post-levée approche...



Rebell® 
le défenseur
des betteraves
en post-levée.

■ COMMENT S'UTILISE-T-IL ?

■ **Mercuriales et ombellifères : BTRV⁽¹⁾ et BTRSV⁽²⁾ (3 à 5 passages) offrent un très haut niveau d'efficacité en post-levée.**

■ **Pour B, T, S et V**, ajuster les doses selon les recommandations ITB, respecter les précautions d'emploi et la liste de mélanges autorisés par le Ministère de l'Agriculture.

■ **Traiter le matin** (hygrométrie, absence de vent), tous les 6 à 10 jours sur adventices jeunes (stade cotylédons à 2 feuilles).

■ DOSE REBELL® T : 1 L/HA

(1) Dès 80 % des betteraves au stade cotylédons.

(2) À partir du T2 de post avec 100 % des betteraves levées. Ajout de S à BTRV recommandé en cas de temps sec en post sur ombellifères et mercuriales.

- Très efficace : 90 - 100%
- Efficace : 80 - 90%
- Moyennement efficace : 60 - 80%

	BTRV ⁽¹⁾	BTRSV ⁽²⁾
Amarante		
Agrostis		
Ambroisie		
Ammi élevé		
Atriplex		
Capselle		
Chenopode		
Coquelicot		
Éthuse		
Euphorbe		
Fumeterre		
Gaillet gratteron		
Lamiers		
Laiteron des champs		
Lampsane		
Matricaire		
Mercuriale		
Morelle		
Mouron des oiseaux		
Mouron des champs		
Ortie royale		
Pâturin annuel		
Pensée sauvage		
Ravenelle		
Renouée liseron		
Renouée persicaire		
Renouée des oiseaux		
Repousses de colza		
Sanve		
Véroniques		
Vulpin		

LE PARTENAIRE INDISPENSABLE DES PRODUITS DE CONTACT.

■ La référence technico-économique sur mercuriales, ombellifères, renouées liseron, gaillets, sanves, véroniques.



Herbicide betteraves

 **BASF**
The Chemical Company

Retrouvez l'ensemble de nos informations produits sur www.basf-agro.fr

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI