

Fongicides céréales

Isba® + Pyros® EW

La solution fongicide qui associe efficacité et rentabilité

BASF
The Chemical Company

Composition de l'offre :

5 L ISBA®

125 g/L kresoxim-méthyl
+ 125 g/L époxiconazole



5 L PYROS® EW

450 g/L prochloraze

● **Isba®** : la triazole de référence + la strobilurine en prime

Epoxiconazole



Kresoxim-méthyl

↳ La valeur sûre référence du marché

↳ Une double performance
sur septoriose et rouilles

↳ La régularité qui a fait ses preuves

↳ La strobilurine qui a fait ses preuves

↳ Complément d'efficacité sur rouilles et
maladies secondaires

↳ Gains de rendement

Efficacité et curativité sur maladies foliaires



Septoriose



Rouille jaune



Rouille brune



Rhynchosporiose



Helminthosporiose

● **Pyros® EW** : un intérêt majeur sur la maladie la plus préjudiciable (Septoriose)


Pyros® EW, formulation

Prochloraze

homologuée sur Septoriose

➤ Le prochloraze **renforce l'efficacité** sur septoriose des triazoles et permet une **meilleure maîtrise des souches TriMR** (moyennement résistantes aux triazoles).

Rendements des Essais Septoriose - 2008 - N=6 essais – Comparaison en programme





PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

La solution fongicide qui associe efficacité et rentabilité


Isba® + Pyros® EW

● Isba® + Pyros® EW : Haut niveau de protection des feuilles (Septoriose)

Excellent rapport technico-économique de l'association Isba® + Pyros® EW face aux solutions de T1 concurrentes.



● POSITIONNEMENT :



Sur blé, Isba® + Pyros® EW s'utilise du stade 1-2 nœuds jusqu'à DFE pour lutter contre septorioses & rouilles.

Sur orge : positionnement à la montaison.

● DOSE : La dose d'Isba® + Pyros® EW est à adapter selon la pression maladies.



Ha par pack	8 Ha	10 Ha
Doses ISBA® & PYROS® EW	0,6L + 0,6L	0,5L + 0,5L

● Fiche d'identité

Isba®

Autorisation de vente : n° 9800329

Composition : 125 g/l de prochloraz-méthyl + 125g/l d'époxiconazole

Formulation : suspension concentrée (SC)

Usages et doses sur céréales :

Blés : septorioses, oïdium, rouille jaune, rouille brune, fusariose des épis : 1 L/ha ; - **Orges :** helminthosporiose, rouille jaune, rhynchosporiose, rouille naine, oïdium : 1L/ha - **Avoine :** rouille couronnée, oïdium : 1L/ha - **Seigle :** rhynchosporiose, rouille brune : 1L/ha - **Triticale :** rouille brune, septoriose : 1L/ha ; **Dose homologuée sur céréales :** 1 l/ha

Classement : Xn : nocif. N : dangereux pour l'environnement. R40 : effet cancérigène suspecté (preuves insuffisantes). R62 : risque possible d'altération de la fertilité. R63 : risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. R50/53 : très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme.

Zone non traitée : 5 mètres (distance par rapport aux points d'eau)

Délai avant récolte en céréales : 35 jours

Délai de rentrée dans les parcelles : 6 heures après traitement

Nombre maximum d'applications par an : 2

Pyros® EW

Autorisation de vente : n° 9300305

Composition : 450 g/l de prochloraz

Formulation : émulsion de type aqueux (EW)

Usages et doses homologuées sur céréales :

Blés : piétin-verse : 1,33 l/ha.

Oïdium, septorioses, fusarioses des épis : 1 l/ha

Orges : oïdium, rhynchosporiose, Helminthosporiose (*D. teres*) : 1 l/ha.

Classement : Xn : Nocif. N : Dangereux pour l'environnement. R48/22 : Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion. R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Zone non traitée : 5 mètres (distance par rapport aux points d'eau) (Cf. Arrêté du 12/09/2006)

Délai avant récolte en céréales : 42 jours

Délai de rentrée dans les parcelles : 6 heures après traitement. (Cf. Arrêté du 12/09/2006)

Protection utilisateur lors manipulation produit : gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4

10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION		
1	Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.	✓
2	Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi.	✓
3	Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).	✓
4	Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.	✓
5	Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).	✓
6	Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor.	✓
PENDANT L'APPLICATION		
7	Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.	✓
APRÈS L'APPLICATION		
8	Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.	✓
9	Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.	✓
10	Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires. BASF Agro recommande le procédé Osmoflow® * Marque déposée BASF PHANTER France	✓

Contacts utiles

Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF Agro	N°Azur 0 810 02 30 33 ou www.basf-agro.fr
Une question de santé	MSA	Physi@line N°Azur 3 600 887 887 www.msa.fr
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0810 12 18 85 ou www.adivalor.fr