

Isba® + Pyros®

Le couple gagnant pour une rentabilité optimisée

Une solution complète qui a fait ses preuves


A vos côtés, Isba® vous accompagne sans surprise depuis 10 ans sur les chemins de la réussite technique.

Une efficacité sur le complexe septoriose-rouilles, l'expérience régionale a montré combien il est important de prendre en compte les deux maladies afin de préserver le potentiel de rendement de vos blés.

La double performance sur septoriose et rouilles

Performance septoriose et rouille brune

3 essais – Application T1



Isba® + Pyros®, la complémentarité

La septoriose, une menace pour le rendement de votre blé. La septoriose est non seulement la maladie la plus fréquente dans les grands bassins céréaliers, mais aussi la plus préjudiciable au rendement : **50 % du potentiel avec diminution du nombre de grains et chute du poids de mille grains.**

Une performance intacte sur rouille. Avec l'association Isba® + Pyros®, vous conservez parfaitement la performance d'Isba® sur rouille.


Isba® + Pyros®

Le couple gagnant pour une rentabilité optimisée

La qualité et le prix pour une bonne protection

Du rendement en plus de l'efficacité.
Avec Isba® + Pyros® vous bénéficiez d'une solution complète d'un excellent rapport qualité/prix, comme les rendements en témoignent.

Rendement 4 essais – Application T1



Comment l'utiliser ?

Stades	Sur blés : du 1 ^{er} passage à début épiaison
Doses	Isba® + Pyros® 0,6 + 0,6 à 0,7 + 0,7 L/ha

Fiche d'identité

Isba®

Autorisation de vente : n° 9800329
Composition : 125 g/l de krésoxim-méthyl + 125g/l d'époxiconazole
Formulation : suspension concentrée (SC)
Usages et doses sur céréales : 1 L/ha
Blés : septorioses, oïdium, rouille jaune, rouille brune, fusariose des épis - **Orges :** helminthosporiose, rouille jaune, rhynchosporiose, rouille naine, oïdium - **Avoine :** rouille couronnée, oïdium - **Seigle :** rhynchosporiose, rouille brune - **Triticale :** rouille brune, septoriose.
Dose homologuée sur céréales : 1 L/ha
Classement : Xn : nocif. N : dangereux pour l'environnement. R40 : effet cancérigène suspecté (preuves insuffisantes). R62 : risque possible d'altération de la fertilité. R63 : risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. R50/53 : très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme.
Zone non traitée : 5 mètres (distance par rapport aux points d'eau)
Délai avant récolte en céréales : 35 jours
Délai de rentrée dans les parcelles : 6 heures après traitement
Nombre maximum d'applications par an : 2

Pyros®

Autorisation de vente : n° 9400494
Composition : 450 g/l de prochloraze
Formulation : concentré émulsionnable (EC)
Usages et doses homologuées sur céréales :
Blés : piétin-verse : 1,33 L/ha.
Orges : oïdium, rhynchosporiose, helminthosporiose : 1 L/ha.
Classement : Xn : nocif. N : dangereux pour l'environnement. R22 : nocif en cas d'ingestion. R41 : risque de lésions oculaires graves. R65 : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. R66 : l'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67 : l'inhalation de vapeurs peut provoquer des somnolences et vertiges. R50/53 : très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme.
Zone non traitée : 5 mètres (distance par rapport aux points d'eau) (Cf. Arrêté du 12/09/2006)
Délai avant récolte en céréales : 42 jours
Délai de rentrée dans les parcelles : 24 heures après traitement. (Cf. Arrêté du 12/09/2006)
Protection utilisateur lors manipulation produit : gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4

10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

- | AVANT L'APPLICATION | |
|-----------------------|---|
| 1 | Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé. |
| 2 | Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi. |
| 3 | Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes). |
| 4 | Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application. |
| 5 | Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse). |
| 6 | Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor. |
| PENDANT L'APPLICATION | |
| 7 | Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments. |
| APRÈS L'APPLICATION | |
| 8 | Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle. |
| 9 | Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche. |
| 10 | Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande le procédé Osmofilm® |

Contacts utiles

Informations techniques Étiquettes et FDS	BASF Agro	N°Azur 0 810 02 30 33 ou www.basf-agro.fr
Une question de santé	MSA	Phyt'Attitude N° Vert 0 800 887 887 appel gratuit depuis un poste fixe
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0810 12 18 85 ou www.adivalor.fr