


Régulateurs de croissance des céréales

Medax® Max

Votre nouveau repère flexibilité et rendement !

BASF
We create chemistry




BÉNÉFICES

- **Très haut niveau d'efficacité anti-verse :**
Medax® Max sécurise le rendement et la qualité de la récolte
- **Simplicité d'utilisation :**
un seul régulateur pour toutes les céréales*, large période d'application
- **Sérénité d'utilisation :**
une efficacité peu dépendante des conditions météo

MEDAX® MAX SÉCURISE LE RENDEMENT ET LA QUALITÉ DE LA RÉCOLTE

■ BLÉ TENDRE D'HIVER

Un très haut niveau d'efficacité anti-verse sur blés




Rendement dans des essais versés (n=4)

Application stade BBCH 31-32

Indice de verse dans les témoins : 58

■ ORGE D'HIVER

Nouvelle référence technique sur orge d'hiver



Rendement dans des essais versés (n=6)

Application stade BBCH 31-32


Indice de verse dans les témoins : 49

UN MAX DE SIMPLICITÉ D'UTILISATION

■ LARGE PÉRIODE D'APPLICATION :

efficace dès épi 1 cm sur blés

STADES ET DOSES
D'APPLICATION SELON
LE RISQUE DE VERSE




■ UN SEUL RÉGULATEUR

pour les blés, orges, avoines et triticale

MÊME
DOSE PIVOT
SUR BLÉ
TENDRE
ET ORGE
D'HIVER

- Risque faible à moyen
- Risque moyen

Blé tendre d'hiver



Orge d'hiver et triticale

0,3 à 0,4 kg/ha

0,4 à 0,5 kg/ha

0,3 à 0,5 kg/ha

0,3 à 0,5 kg/ha

Éthéphon

Orge de printemps

0,3 kg/ha

0,2 à 0,3 kg/ha

Éthéphon

* hors seigle


UN MAX DE SÉRÉNITÉ D'UTILISATION

EFFICACITÉ PEU DÉPENDANTE DES CONDITIONS MÉTÉO :

- Medax® Max est efficace dès 8°C
- Medax® Max est efficace même en situation de faible luminosité

Appliquer Medax® Max sur des céréales en bon état végétatif : éviter les périodes de stress hydrique, de faim d'azote et de carence.

TEMPÉRATURES À RESPECTER LE JOUR DU TRAITEMENT ET PENDANT LES 3 JOURS QUI SUIVENT



MISE EN ŒUVRE VIA « LE TROU D'HOMME »

Pour certains pulvérisateurs où le produit passe du bac incorporateur par le « trou d'homme » avant d'arriver dans la cuve : si l'accessibilité le permet et s'il n'y a pas de risque d'éclaboussure avec l'agitation, privilégier la mise en œuvre du produit en formulation WG via le « trou d'homme ».

Utiliser le mode opératoire suivant :

1. Remplir la cuve au 1/3 du volume d'eau nécessaire et mettre l'agitation en marche.
2. Retirer le filtre à l'entrée du « trou d'homme ».
3. Verser progressivement le produit en formulation WG dans la cuve sous agitation.
4. Si mélanges avec d'autres produits prévus, bien attendre la dissolution de la formulation en granulés avant l'adjonction d'un autre produit.

MISE EN ŒUVRE VIA LE BAC INCORPORATEUR

Utiliser le mode opératoire suivant :

1. Les parois du bac incorporateur doivent rester **les plus sèches possibles** pour faciliter l'écoulement du produit le long des parois
2. Retirer **la grille du bac incorporateur** si les mailles du tamis sont < à 10 mm.
3. Actionner la vanne d'aspiration prévue pour aspirer le produit du bac incorporateur vers la cuve.
4. **Verser progressivement le produit en formulation WG**, dans le bac en l'absence de tout volume d'eau résiduaire au fond du bac incorporateur

Marque déposée BASF	Medax® Max
AMM	N°2170933
Composition	50 g/kg de prohexadione-calcium + 75 g/kg de trinéxapac-éthyl
Formulation	WG - granulés dispersables
Usages et doses autorisées	Limitation de la croissance des organes aériens. Blé tendre d'hiver, blé dur d'hiver, triticale, avoine d'hiver : 0,75 kg/ha ; Avoine et blés de printemps : 0,5 kg/ha ; Orge d'hiver : 1 kg/ha ; Orge de printemps : 0,75 kg/ha.
Stades d'application	Du stade BBCH 29 au stade BBCH 39 de la céréale.
Nombre d'application	1 par an, sauf Blé tendre d'hiver, blé dur d'hiver, triticale, épeautre, orge d'hiver : 1 / an fractionnement possible en 2 applications
Classement toxicologique	H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.
ZNT Aquatique	5 mètres
DAR	F (utiliser avant le stade 39 compris)
DRE	6 heures
Medax® Max est inscrit sur la liste des spécialités phytopharmaceutiques testées et acceptées sur orges de brasserie d'hiver et de printemps.	

Classement toxicologique de l'éthéphon	H302, H311, H314, H332, H411
Classement toxicologique du trinéxapac-éthyle	H411
Classement toxicologique du C5 - Chlorméquat	H302

Pour toutes informations techniques,
nos experts sont à votre écoute

0 800 100 299 ➤ Service & appel gratuits

Protection utilisateur lors de la préparation de la bouillie : gants en nitrile EN374, bottes, combinaison de travail polyester/coton (65%/35%) déperlante, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.

465CERE1218EST - Décembre 2018

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez : <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>.

Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.agro.bASF.fr et/ou www.phytodata.com

BASF FRANCE SAS – DIVISION AGRO
21 CHEMIN DE LA SAUVEGARDE – 69134 EULLY CEDEX
T. 04 72 32 45 45 – www.agro.bASF.fr

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**