

# Attention, végétation avancée

## PÉRIODE DE FORTE SENSIBILITÉ POUR



- LE MILDIOU
- L'OÏDIUM
- LE BLACK ROT

Pensez dès maintenant à votre encadrement floraison.

Ciblez les trois maladies avec un seul produit :



N'attendez pas qu'il soit trop tard pour utiliser un:



Le programme sécurité de la pré-floraison à la nouaison.



EVIDEMMENT...En cas de fort risque de contaminations Mildiou préférez:



### Cabrio® Star

- Composition : 40 g/l de pyraclostrobine + 400 g/l de folpel
- Autorisation de vente : 2010588
- Conditionnement : 6 kg
- Formulation : suspo-émulsion
- Usages et doses autorisées sur Vigne :
  - Mildiou : 2,5 l/ha
  - Oïdium : 1,25 l/ha
  - Black-rot, rougetoïd parasitaire : 1,87 l / ha

### Fastime®

- Composition : 11,3% de diméthomorphe + 60% de folpel
- Classement toxicologique : Xn - R20 - R36/38- R40 - R43 AQUA
- Nombre maximum de traitement par saison : 3 dont 2 consécutifs maximum
- Décal d'emploi avant récolte – DAR : 35 jours
- ZNT : 20 m
- Délai de rentrée dans les parcelles : 24 heures

- Nombre maximum de traitement par saison : 3
- Décal d'emploi avant récolte – DAR : 28 jours

• ZNT : 5 mètres

• Délai de rentrée dans les parcelles : 48 h