

Attention, végétation avancée

PÉRIODE DE FORTE SENSIBILITÉ POUR



- LE MILDIOU
- L'OÏDIUM
- LE BLACK ROT

Pensez dès maintenant à votre encadrement floraison.

Ciblez les trois maladies avec un seul produit :



N'attendez pas qu'il soit trop tard pour utiliser un:



Le programme sécurité de la pré-floraison à la nouaison.



EVIDEMMENT...En cas de fort risque de contaminations Mildiou préférez:



Cabrio® Top

- Composition : 5% de pyraclostrobine + 55% de métiramé zinc
- Autorisation de vente : 2000336
- Conditionnement : 6 kg
- Formulation : granulés dispersibles
- Usages et doses autorisées sur Vigne :
 - Mildiou : 2 kg/ha
 - Oïdium : 1 kg/ha
 - Black-rot, rougeot parasitaire : 1,5 kg / ha

Fastime®

- Composition : 11,3% de diméthomorphe + 60% de folpel
- Autorisation de vente : 9900398
- Conditionnement : bidon de 4 kg
- Formulation : granulés dispersibles
- Usages et doses autorisées sur Vigne :
 - mildiou : 2 kg / ha
 - Classement toxicologique : Xn - R40 - R43 - AQUA

- Nombre maximum de traitement par saison : 3
- Décal d'emploi avant récolte - DAR : 28 jours
- ZNT : 5 mètres
- Délai de rentrée dans les parcelles : 48 h