

# Attention, végétation avancée

## PÉRIODE DE FORTE SENSIBILITÉ POUR



- LE MILDIOU
- L'OÏDIUM
- LE BLACK ROT

Pensez dès maintenant à votre encadrement floraison.

Ciblez les trois maladies avec un seul produit :



N'attendez pas qu'il soit trop tard pour utiliser un:



Le programme sécurité de la pré-floraison à la nouaison.



EVIDEMMENT...En cas de fort risque de contaminations Mildiou préférez:



### Cabrio® Top

- Composition : 5% de pyraclostrobine + 55% de métiram zinc
- Autorisation de vente : 2000336
- Conditionnement : 6 kg
- Formulation : granulés dispersibles
- Usages et doses autorisées sur Vigne :
  - Mildiou : 2 kg/ha
  - Oïdium : 1 kg/ha
  - Black-rot, rougeot parasitaire : 1,5 kg / ha

- excoriose : 0,15 kg / hl
- Classement toxicologique : Xn - R22 - R38 - AQUA
- Nombre maximum de traitement par saison : 3 dont 2 consécutifs maximum
- Délai d'emploi avant récolte - DAR : 35 jours
- ZNT : Respecter une zone non traitée de 20 m à la dose de 2 kg/ha et 5 m à la dose de 1 kg/ha
- Délai de rentrée dans les parcelles : 24 heures

### Panthéos®

- Composition : 11,3% de diméthomorphe + 60% de folpel
- Autorisation de vente : 9700463
- Conditionnement : bidon de 4 kg
- Formulation : granulés dispersibles
- Usages et doses autorisées sur Vigne :
  - mildiou : 2 kg / ha
  - Classement toxicologique : Xn - R40 - R43 - AQUA

- Nombre maximum de traitement par saison : 3
- Délai d'emploi avant récolte - DAR : 28 jours
- ZNT : 5 mètres
- Délai de rentrée dans les parcelles : 48 h