

Attention, végétation avancée

PÉRIODE DE FORTE SENSIBILITÉ POUR



- LE MILDIOU
- L'OÏDIUM
- LE BLACK ROT

Pensez dès maintenant à votre encadrement floraison.

Ciblez les trois maladies avec un seul produit :

→ **Equerre®**

N'attendez pas qu'il soit trop tard pour utiliser un:

→ **FASTIME® (grape)** (Préventif, curatif et anti-sporulant)

Le programme sécurité de la pré-floraison à la nouaison.



Equerre® Equerre® FASTIME® (grape)

EVIDEMMENT...En cas de fort risque de contaminations Mildiou préférez:

FASTIME® (grape) Equerre® Equerre®

Equerre®

- Composition : 40 g/l de pyraclostrobine + 400 g/l de folpel
- Autorisation de vente : 2030076
- Conditionnement : 6 kg
- Formulation : suspo-émulsion
- Usages et doses autorisées sur Vigne :
 - Mildiou : 2,5 l/ha
 - Oïdium : 1,25 l/ha
 - Black-rot, rouget et parasitaire : 1,87 l / ha
- Excoriose : 0,2 l / hl
- Classement toxicologique : Xn - R20 - R36/38- R40 - R43 AQUA
- Nombre maximum de traitement par saison : 3 dont 2 consécutifs maximum
- Délai d'emploi avant récolte – DAR : 35 jours
- ZNT : 20 m
- Délai de rentrée dans les parcelles : 24 heures

Fastime®

- Composition : 11,3% de diméthomorphe + 60% de folpel
- Autorisation de vente : 9900398
- Conditionnement : bidon de 4 kg
- Formulation : granulés dispersibles
- Usages et doses autorisées sur Vigne :
 - mildiou : 2 kg / ha
- Classement toxicologique : Xn - R40 - R43 - AQUA