

L'Excoriose c'est maintenant !



Situation

- En augmentation dans l'ensemble des vignobles (retrait arsénite et démarrage des traitements mildiou souvent retardé)
- Pluie en début de printemps → Dissémination des spores

Nuisibilité

- L'excoriose entraîne essentiellement des pertes quantitatives de récolte :
 - Avortement des bourgeons et croissance ralentie des pousses malades
 - Fragilisation (problème au liage, au palissage), et casse des sarments (au vent)
 - Etranglement des sarments conduisant à leur mort

Comment lutter ?

- L'excoriose est une maladie à foyers :
 - Présente sur les bois : on éliminera les bois contaminés lors de la taille et on les brûlera.
 - On effectuera un **traitement spécifique** en tout début de saison.
 - Traiter à la limite du ruissellement(300 –500 l) avec un appareil à jet projeté
 - Bien mouiller la zone de taille et les bourgeons
- Bien positionner l'intervention c'est :
 - En traitement unique → traiter avant la contamination.
 - En double traitement → on sécurise l'intervention pour une protection faite sur une période plus longue

L'Excoriose Comment traiter ?

Quand traiter ?



40% des bourgeons
au stade D



Traitement unique : Quand 40% des bourgeons sont au stade D

40% des bourgeons
au stade D



50% des bourgeons
au stade E

Double traitement : Quand 40% des bourgeons sont au stade D
Puis renouveler quand 50% des bourgeons sont au stade E

Tout traitement réalisé hors de cette période est inefficace

Choisir sa stratégie de traitement

- **Choix du traitement unique**, au stade pointes vertes (D) avant la pluie contaminatrice
- **Choix du double traitement**, pointes vertes (D) et 2-3 feuilles étalées (E) pour encadrer la période de contaminations :

● Polyram® (0,3 kg/hl)