

AVANT L'APPLICATION

- 1  Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé. 
- 2  Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi. 
- 3  Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes). 
- 4  Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application. 
- 5  Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse). 
- 6  Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor. 

PENDANT L'APPLICATION

- 7  Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments. 

APRÈS L'APPLICATION

- 8  Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle. 
- 9  Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche. 

Contacts utiles

Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF Agro	 N° Azur 0 810 02 30 33 ou www.basf-agro.fr
Une question de santé	MSA	 Phyt'Attitude  N° Vert 0 800 887 887
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	 N° Azur 0810 12 18 85 ou www.adivalor.fr

Fiche technique

Isard® : Marque déposée BASF
Autorisation de vente : n°9900251
Composition : 720 g/L dmta-p
Formulation : EC
Classement toxicologique :
 Xn : Nocif - R22 : Nocif en cas d'ingestion
 R36 : Irritant pour les yeux
 R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau - AQUA : Dangereux pour les organismes aquatiques
Usages et doses autorisées :
 • maïs, maïs doux : 1,4 L/ha
 • sorgho : 1,2 L/ha
Nombre maximum de traitements par an :
 • maïs, sorgho : 1

Délai avant récolte :

- maïs, sorgho : 90 j
 - maïs doux : 60 j
- Distance par rapport au point d'eau** : Respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 mètres (cf arrêté JO du 21/09/07)

Délai de rentrée : 48 h (cf arrêté JO du 21/09/07)**Protection utilisateur lors manipulation produit** :

Gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, vêtements de travail de niveau de protection 4.



Une seule de ces plantes bénéficie d'un **désherbage optimisé** même en **conditions difficiles** !



Isard®



BASF
The Chemical Company

4 bonnes raisons d'utiliser Isard®

1 Avec Isard®, c'est la maîtrise des graminées dès la Pré-levée !

- Haut niveau d'efficacité,
- Gestion des levées échelonnées de graminées,
- Action complémentaire sur les dicotylédones y compris sur flore émergente.

Grâce à l'action d'Isard®, vous minimisez le désherbage en Post-levée :

- moins de pression dicotylédones,
- des adventices diminuées,
- des levées groupées.

2 Avec Isard® vous désherbez même quand les conditions climatiques sont moins favorables à la Pré-levée !

Quand les conditions d'humidité du sol sont moins favorables aux produits de Pré-levée, les caractéristiques physico-chimiques d'Isard® permettent la diffusion du dmta-p dans les premiers centimètres du sol. Le produit peut agir.

3 Avec Isard® vous désherbez en toute simplicité !

Souple et polyvalent, Isard® s'utilise en Pré et en Post-levée précoce.

Homologué sur maïs, maïs doux et sorgho, il assure une action complémentaire sur les dicotylédones y compris sur la flore émergente.

4 Avec Isard® vous désherbez sans forcer !

5 L permettent de traiter plus de 4 hectares à la dose moyenne de 1,2 L/ha.

C'est moins de produit à manipuler, à transporter, moins d'emballages à rincer et à détruire.

Efficacité : ● Très sensible (> 95 %) ● Sensible (85-95 %) ● Moyennement sensible (70-85 %) ● Peu sensible (50-70 %)

Amarante réfléchie	●	Lamier pourpre	●	Pourpier	●
Amarante verte	●	Linaire	●	Renouée à f. de patience	●
Arroche étalée	●	Matricaire camomille	●	Renouée liseron	●
Arroche hastée	●	Mercuriale annuelle	●	Renouée des oiseaux	●
Capselle	●	Morelle noire	●	Renouée persicaire	●
Chénopode blanc	●	Mouron des oiseaux	●	Sanve	●
Datura stramoine	●	Panic faux millet	●	Sétaire verte	●
Digitaire sanguine	●	Panic pied-de-coq	●	Sétaire verticillée	●
Fumeterre officinale	●	Paturin annuel	●	Seneçon commun	●
Laiteron des champs	●	Pensée des champs	●	Véronique de perse	●

Isard® et vous...

