

Des solutions pour la conduite de votre verger

REGALIS®

répond à vos attentes:




- ⇒  du nombre de gourmands.
- ⇒  du temps de taille.
- ⇒ Aide à la formation de l'arbre.
- ⇒ Récolte et taille facilitées.
- ⇒ Meilleur équilibre entre croissance végétative et mise à fruit.
- ⇒ Possibilité d'orienter la formation des arbres par pulvérisation dirigée.
- ⇒  des rameaux vigoureux pour préserver les filets pare-grêle.
- ⇒  exposition des fruits à la lumière.



La performance et le confort dès le début de programme anti-tavelure

Tavelure sur pommier Merville (31) - 2004
Essai comportement -T1+125 jours.



* Solution en mélange extemporané possible depuis la publication au J.O. de l'Arrêté du 13/03/06 relatif aux mélanges extemporanés des produits phytopharmaceutiques.

Plus d'efficacité, grâce à la synergie prouvée des 2 partenaires.

Persistante d'action : jusqu'à 7 jours¹

Activité curative jusqu'à 72 h **maximum** (feuillage)

Bonne souplesse d'utilisation de la préfloraison à la pleine fleur.

Efficace même par températures froides (< 15 °C)

Plus de sécurité dans la gestion des résistances.

Dose d'emploi de 0,05 l/hl pour Sari² + 0,05 kg/hl pour Delan



1- En cas de situation cumulant fortes projections et grande vitesse de développement de la végétation, réduire la cadence d'un ou deux jours .

2- Dans le cadre d'une bonne gestion de la famille, limiter à 3 applications par an l'emploi de spécialités à base d'anilino-pyrimidines, dont deux consécutives maximum.

Qu'est-ce que Regalis® ?

- Composition : 10% de prohexadione-calcium
- Conditionnement : bidon de 1kg
- Formulation : granulés dispersibles
- Usages et doses autorisées sur pommier : limitation de la croissance des organes aériens : 0,25 kg/l
- Classement toxicologique : sans classement
- Délai d'emploi avant récolte – DAR : 55 jours
- Distance par rapport au point d'eau – ZNT : 5 mètres
- Délai de rentrée dans les parcelles : 6 h

Qu'est-ce que Delan® WG ?

- Composition : 70% de dithinon
- Conditionnement : bidon de 2 kg
- Formulation : granulés dispersibles
- Usages et doses autorisées sur pommier :
 - Tavelure : 0,05 kg/l
 - Classement toxicologique : R22, R41, R43, AQUA
 - Délai d'emploi avant récolte – DAR : 28 jours
 - Distance par rapport au point d'eau – ZNT : 20 mètres
 - Délai de rentrée dans les parcelles : 48 h

Qu'est-ce que Sari® TF ?

- Composition : 400g/l de pyriméthanal
- Conditionnement : bidon de 1 L
- Formulation : Suspension concentrée
- Usages et doses autorisées sur pommier :
 - Tavelure : 0,05 l/hl, s'utilise jusqu'à la chute des pétales
 - Classement toxicologique : AQUA
 - Nombre d'application / an : 4
 - Délai d'emploi avant récolte – DAR : 28 jours
 - Distance par rapport au point d'eau – ZNT : 50 mètres
 - Délai de rentrée dans les parcelles : 6 h