

Les solutions pour votre programme anti-tavelure

La performance et le confort dès le début de programme anti-tavelure



Plus d'efficacité, grâce à la synergie prouvée des 2 partenaires.

Persistance d'action : jusqu'à 7 jours¹

Activité curative jusqu'à 72 h **maximum** (feuillage)



Bonne souplesse d'utilisation de la préfloraison à la pleine fleur.

Efficace même par températures froides (< 15 °C)

Plus de sécurité dans la gestion des résistances.

Dose d'emploi de 0,05 l/hl pour Sari² + 0,05 kg/hl pour Delan



* Solution en mélange extemporané possible depuis la publication au J.O. de l'Arrêté du 13/03/06 relatif aux mélanges extemporanés des produits phytopharmaceutiques.

La sécurité contre tavelure et oïdium



Efficace contre tavelure (feuilles et fruits)

Efficace contre l'oïdium

Persistance d'action : jusqu'à 7 jours¹

Activité curative jusqu'à 48 Heures **maximum**



Protection à l'abri du lessivage pour les deux molécules

Parfaitement sélectif, même pendant la floraison

Dose d'emploi de 0,1 l/hl

1- En cas de situation cumulant fortes projections et grande vitesse de développement de la végétation, réduire la cadence d'un ou deux jours .

2- Dans le cadre d'une bonne gestion de la famille, limiter à 3 applications par an l'emploi de spécialités à base d'anilino-pyrimidines, dont deux consécutives maximum.

Qu'est-ce que Vision® ?

- Composition : 400g/l de pyriméthanal + 50g/l de fluquinconazole
- Conditionnement : bidon de 5 L
- Formulation : Suspension concentrée
- Usages et doses autorisées sur pommier :
 - Tavelure et Oïdium: 0,1 l/hl
- Classement toxicologique : Xn, R22, R40, AQUA
- Nombre d'application / an : 3
- Délai d'emploi avant récolte – DAR : 28 jours
- Distance par rapport au point d'eau – ZNT : 5 mètres
- Délai de rentrée dans les parcelles : 6 h

Qu'est-ce que Delan® WG ?

- Composition : 70% de dithianon
- Conditionnement : bidon de 2 kg
- Formulation : granulés dispersibles
- Usages et doses autorisées sur pommier :
 - Tavelure : 0,05 kg/hl
- Classement toxicologique : Xn, R22, R41, R43, AQUA
- Délai d'emploi avant récolte – DAR : 28 jours
- Distance par rapport au point d'eau – ZNT : 20 mètres
- Délai de rentrée dans les parcelles : 48 h

Qu'est-ce que Sari® TF ?

- Composition : 400g/l de pyriméthanal
- Conditionnement : bidon de 1 L
- Formulation : Suspension concentrée
- Usages et doses autorisées sur pommier :
 - Tavelure : 0,05 l/hl, s'utilise jusqu'à la chute des pétales
- Classement toxicologique : R51/53 – Port de gants obligatoires
- Nombre d'application / an : 3
- Délai d'emploi avant récolte – DAR : 28 jours
- Distance par rapport au point d'eau – ZNT : 50 mètres
- Délai de rentrée dans les parcelles : 6 h