

Réussissez votre colza

avec

Zebra®

BASF
The Chemical Company

en Pré-levée
3 L/Ha



Dicotylédones*

• Aichémille	(12)	96
• Arabette	(1)	100
• Capselle bourse à p.	(20)	99
• Céraiste	(2)	100
• Chénopode	(7)	95
• Coquelicot	(25)	91
• Ethuse	(1)	95
• Jonc des crapauds	(5)	97
• Laiteron sp	(3)	98
• Lamier pourpre	(7)	100
• Lampsane commune	(5)	91
• Lierre terrestre	(1)	100
• Matricaire	(20)	98
• Miroir de vénus	(1)	100
• Morelle noire	(4)	96
• Myosotis des champs	(2)	98
• Passerage	(5)	92
• Renouée Liseron	(1)	100
• Séneçon vulgaire	(7)	99
• Sisymbre	(5)	98
• Stellaire	(27)	98
• Tabouret des champs	(1)	100
• Véronique de Perse	(22)	96

• Carotte sauvage	(4)	80
• Diplotaxis	(1)	88
• Gaillet gratteron	(24)	86
• Rapistre	(1)	82
• Ravenelle	(5)	87
• Renoncule	(9)	81
• Shérardie	(3)	81
• Torilis	(2)	83
• Véronique f. de lierre	(11)	82
• Euphorbe sp	(2)	78
• Fumeterre	(5)	78
• Géranium mou	(3)	69
• Liseron des champs	(1)	70
• Mercuriale	(17)	68
• Sanve	(17)	72
• Barbarée	(4)	64
• Bleuet	(3)	63
• Calépine	(3)	54
• Géranium disséqué	(16)	54
• Géranium colombin	(1)	47
• Géranium à f. ronde	(16)	60
• Géranium tige grêle	(7)	47
• Pensée	(22)	64
• Scandix	(5)	64

Graminées*

• Pâturin annuel	(10)	97
• Ray-grass	(17)	90
• Vulpin	(28)	88
• Folle avoine	(2)	65
• Brome stérile	(4)	58
• Repousses blé	(39)	62
• Repousses orge	(21)	59

Efficacité

90-100 %	■
80-89 %	■
65-79 %	■
< 65 %	■

* Les pourcentages d'efficacité correspondent à une moyenne issue des résultats d'essais (BASF, CETIOM), ce qui n'exclut pas ponctuellement un taux d'efficacité pouvant être inférieur pour l'une ou l'autre des mauvaises herbes.

LES 6 POINTS CLEFS DE LA FORCE ZEBRA®

PERMET DE DESHERBER EN UN SEUL PASSAGE
TRES EFFICACE SUR VULPINS, RAY-GRASS
TRES EFFICACE SUR DICOTYLEDONES
TRES BONNE REGULARITE
BONNE SELECTIVITE
NOMBREUSES CULTURES DE REMPLACEMENT

© Marque déposée BASF. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Avant toute utilisation de ZEBRA, s'assurer de son adéquation avec la filière de production et avec les recommandations officielles régionales. Référence : 21900LHBE0808NORD

ZEBRA: Composition : 250 g/L de métazachlore + 33,3 g/L de clomazone Clomazone : matière active FMC Autorisation de vente n° 2000085 Formulation : SE (Suspo-émulsion) Usages et doses autorisées : Désherbage colza : 3 L/ha Classement toxicologique : Xi : irritant, N : Dangereux pour l'environnement, R43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau, R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme Délai avant récolte > 100 jours (Cf. Arrêté JO du 21/09/06) Distance aux points d'eau : respecter une zone non traitée minimale de 5 m sur colza (Cf. Arrêté JO du 21/09/06) Délai de rentrée : 48h (Cf. Arrêté du 21/09/06)

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI