



En association, un spectre d'action

EXTRA LARGE

contre les mauvaise herbes de vos maïs

Les points forts MIKADO®

Panic Pied de Coq	
Digitaire sanguine	
Chénopodes Blanc et Hybride	
Morelle noire	
Datura stramoine	
Renouée persicaire	< 4F

Les points forts BASAMAÏS®

Chénopode blanc	
Amarante réfléchie	
Morelle noire	
Pourpier commun	
Renouée persicaire	
Renouée feuille de patience	

Légende :
 85-95% d'efficacité
 95% d'efficacité




EN ASSOCIATION :



Laiteron




Digitaire Sanguine



Chénopode blanc



Morelle Noire



Amarante réfléchie



Datura



Lampourde



Ravenelle



Renouée Persicaire



Renouée F. patience



Pourpier commun



Souchet comestible



Avec
en plus
un effet
frein sur



Liseron des haies

COMMENT LES UTILISER ?

RECOMMANDATION GENERALE :

0.5 l/ha MIKADO®

+ 1 l/ha BASAMAÏS®

*Excellente sélectivité :
du stade 2
à 12 feuilles
du maïs*

Autres flores :

- Dominante ou présence significative pourpier, liseron des haies, souchet comestible, datura :

MIKADO® (0.5 à 1 l/ha) + BASAMAÏS® (1.5 l/ha)

- Dominante digitaire développée, amarantes, panic pied de coq, ... :

BASAMAÏS® (1 l/ha) + MIKADO® (0.75 l/ha)

POUR UNE EFFICACITE OPTIMUM

- Appliquer sur une culture en bon état végétatif
- Traiter avec une hygrométrie suffisante sur pousses actives des adventices
- Privilégier les stades d'adventices jeunes (3-4 feuilles dicotylédones et avant tallage des graminées)
- Volume de bouillie optimum 200 à 250 l/ha
- Dans tous les cas, privilégier une intervention avant 6 feuilles du maïs pour éviter les effets parapluie.