

Fongicides céréales

Opus® Team + Pyros® EW

La solution fongicide qui associe efficacité et rentabilité

BASF
The Chemical Company

Composition du Pack :

5 L de Opus® Team

250 g/L fenpropimorphe
+ 84 g/L époxiconazole



5 L de PYROS® EW

450 g/L prochloraze

Opus team® : la triazole de référence suractivée

Epoxiconazole



Fenpropimorphe

➤ La valeur sûre référence du marché

➤ Une double performance
sur septoriose et rouilles

➤ La régularité qui a fait ses preuves

➤ Double la vitesse de pénétration de
l'époxiconazole dans la feuille

➤ Un site d'action différent

➤ Un Spectre d'activité plus large
(rouilles, oïdium, rhynchosporiose)

Efficacité et curativité renforcées sur maladies foliaires (face à l'époxiconazole solo)



Septoriose



Oïdium




Rouille jaune



Rouille brune



Rhynchosporiose





Helminthosporiose

Pyros® EW : un intérêt majeur sur la maladie la plus préjudiciable (Septoriose)

Pyros® EW, formulation **Prochloraze** homologuée sur Septoriose

- Le prochloraze **renforce l'efficacité** sur septoriose des triazoles et permet une **meilleure maîtrise des souches TriMR** (moyennement résistantes aux triazoles). En 2009, le prochloraze a confirmé son **pouvoir de contre-sélection des TriMR au profit des TriLR** (souches sensibles aux triazoles).

Rendements des Essais Septoriose - 2008 - N=6 essais – Comparaison en programme



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

La solution fongicide qui associe efficacité et rentabilité

**Opus® Team®
+ Pyros® EW**

Opus® Team + Pyros® EW : Haut niveau de protection des feuilles (Septoriose)

➤ **Excellent rapport technico-économique** de l'association Opus® Team + Pyros® EW face aux solutions de T1 concurrentes.

5 Essais


Arvalis 2009

Simple application


Dernière feuille
pointante à étalée

Efficacité Septoriose (%)

Quantité
témoin : 61%
E.T.R. : 8,0
P : 0




Rendement brut et net (q/ha)



Rendement
brut témoin :
72,8 q/ha
E.T.R. : 3,5
P < 0,01

• POSITIONNEMENT :



Sur blé, Opus® Team + Pyros® EW s'utilise du stade 1-2 nœuds jusqu'à DFE pour lutter contre septorioses & rouilles.

Sur orge : positionnement à la montaison.

• DOSE :

La dose d'Opus® Team + Pyros® EW est à adapter selon la

5 L de Opus® Team

250 g/L fenpropimorphe
+ 84 g/L époxiconazole

+

5 L de PYROS® EW

450 g/L prochloraze

1 Pack pour

Pression des maladies foliaires (Septoriose, Rouilles...)

forte

moyenne

faible

5 Ha

7 Ha

8 Ha

Opus® Team 1L
+ Pyros® EW 1L

Opus® Team 0,71L
+ Pyros® EW 0,71L

Opus® Team 0,63L
+ Pyros® EW 0,63L

Opus® Team

Autorisation de vente : n°9200020

Composition : 84 g/L d'époxiconazole + 250 g/L de fenpropimorphe

Formulation : suspension émulsionnable (SE)

Usages autorisés : Blés : septorioses, rouille brune, rouille jaune, fusariose des épis, oïdium - Orges : helminthosporiose, rouille jaune, rhynchosporiose, rouille naine, oïdium - Avoine : rouille couronnée, oïdium - Triticale : rouille brune, septoriose - Seigle : rhynchosporiose, rouille brune

Dose homologuée sur céréales : 1,5 L/ha

Classement : N : Dangereux pour l'environnement - Xn : Nocif - R40 : effet cancérigène suspecté : preuves insuffisantes - R62 : risque possible d'altération de la fertilité - R63 : risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant - R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Distance aux points d'eau : Respecter une zone non traitée de 20 mètres

Délai de rentrée dans les parcelles : 6 H (Cf Arrêté du 12/09/2006)

Délai avant récolte sur céréales : 35 jours.

Pyros® EW

Autorisation de vente : n° 9300305

Composition : 450 g/L de prochloraze

Formulation : émulsion de type aqueux (EW)

Usages et doses homologués sur céréales :

Blés : piétin-verse : 1,33 l/ha. - Oïdium, septorioses, fusarioses des épis : 1 l/ha
Orges : oïdium, rhynchosporiose, Helminthosporiose (*D. teres*) : 1 l/ha.

Classement : Xn : Nocif. N : Dangereux pour l'environnement. R48/22 : Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion. R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Zone non traitée : 5 mètres (distance par rapport aux points d'eau) (Cf. Arrêté du 12/09/2006)

Délai avant récolte en céréales : 42 jours

Délai de rentrée dans les parcelles : 6 heures après traitement. (Cf. Arrêté du 12/09/2006)

Protection utilisateur lors manipulation produit : gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4

10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION

- 1 Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
- 2 Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi.
- 3 Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
- 4 Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
- 5 Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
- 6 Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor.

PENDANT L'APPLICATION

- 7 Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

APRÈS L'APPLICATION

- 8 Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
- 9 Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
- 10 Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande le procédé Osmofil®

Contacts utiles

Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF Agro	N°Azur 0 810 02 30 33 ou www.basf-agro.fr
Une question de santé	MSA	Phyt'assistance 01 49 64 57 33
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0810 12 18 85 ou www.adivalor.fr

OPUS® - 125g/L époxiconazole - N° AMM 9200018 - N - Xn - R40 - R62 - R63 - R50/53 - Marque déposée BASF. Dangereux - Respecter les précautions d'emploi, lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation. Janvier 2012 annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ces produits, de s'assurer avant toute application, auprès du N°Azur BASF AGRO -0810 023 033- qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. 458FCEFG01120UEST