

# Osiris® Win + Pyros® EW

La solution triazole haute performance sur septo et rouilles avec un investissement modéré



## LES ENJEUX PROTECTION FONGICIDE MONTAISON

Garantir une bonne efficacité septorioses et rouilles : disposer de souplesse et de curativité pour la sérénité en toutes situations.

Investir au juste niveau sur le T1 pour préserver l'investissement T2 à la hauteur du bénéfice attendu

Pérenniser son programme et ses modes d'action

## LES ATOUTS Osiris® Win + Pyros® Ew

1. **Haute performance** septoriose, rouilles jaune et brune doublée d'un **excellent rapport qualité/prix**
2. **Haut niveau de curativité** pour plus de **souplesse d'emploi**
3. Le **parfait équilibre de 3 matières actives** complémentaires pour la gestion des modes d'action et une formulation optimisée pour atteindre la **performance Stick & Stay**
4. Un **conditionnement** apprécié **StampPack 10L + 5L**




StampPack 10 + 5




## SUR SEPTORIOSE

Efficacité et Rendements – Septoriose  
n=6 – Application BBCH / BBCH



## TOUTES SITUATIONS

Efficacité et Rendements – toutes situations  
n=12 – Application BBCH / BBCH




**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# Osiris® Win + Pyros® EW

La solution triazole haute performance sur septorioses et rouilles avec un investissement modéré

## RECOMMANDATION D'UTILISATION



\*Respecter le ratio du mélange : Osiris® Win 1 + Pyros® EW : 0,5

- Sur **septoriose et rouilles**, adapter la dose en fonction de la pression des maladies, du programme de protection envisagé.
- Si pression **rouille jaune précoce**, utilisable dès épi 1 cm.
- Ce mélange est utilisable dans le cadre d'une lutte conjointe contre la septoriose.

### 10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

#### AVANT L'APPLICATION

- 1 ► Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
- 2 ► Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi avant utilisation.
- 3 ► Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
- 4 ► Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
- 5 ► Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
- 6 ► Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve, ou utiliser l'incorporateur.

#### PENDANT L'APPLICATION

- 7 ► Ne pas traiter les cours d'eau et fossés en eau. Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

#### APRÈS L'APPLICATION

- 8 ► Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
- 9 ► Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
- 10 ► Recycler les emballages dans le cadre des collectes **ADIVALOR**. Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF recommande Osmofilm®.

© Marque déposée Sté PANTEK France

Osiris Win® : AMM : n°2090092

Osiris Win® : marque déposée BASF

Composition : 37,5 g/L d'époxiconazole + 27,5 g/L de metconazole.

Formulation : concentré émulsionnable (EC)

Usages et doses autorisés :

**BLES, TRITICALE** : septorioses, rouilles brune et jaune, fusarioses des épis, helminthosporiose : 3L/ha

**ORGES** : rhynchosporiose, helminthosporiose, rouille naine : 2L/ha.

**SEIGLES** : rhynchosporiose, rouille brune : 2L/ha.

**AVOINES** : rouille couronnée : 3L/ha.

Classement :



Mention d'avertissement : **Attention**

**H317** : peut provoquer une allergie cutanée.

**H351** : susceptible de provoquer le cancer.

**H361fd** : susceptible de nuire à la fertilité.

susceptible de nuire au fœtus

**H400** : très toxique pour les organismes aquatiques,

**H411** : toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Distance aux points d'eau** : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

**Distance aux aires non cultivées adjacentes** : pour protéger les arthropodes et les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres en bordure d'une aire non-cultivée adjacente.

**Nombre maximum d'applications** : 2/an sur blé, triticales 2 à 21 jours d'intervalle

**Délai avant récolte** : 35 jours.

**Délai de rentrée dans la parcelle** : 48 heures après traitement.

**Protection utilisateur lors de la manipulation produit** :

Gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4.

Pyros® Ew : AMM : n° 93000305

Pyros® Ew : Marque déposée BASF

Composition : 450 g/L de prochloraz

Formulation : émulsion de type aqueux (EW)

Usages autorisés :

**BLES** : piétin-verse : 1,33 L/ha

oïdium, septorioses, fusarioses des épis : 1L/ha

**ORGES** : oïdium, rhynchosporiose,

Helminthosporiose (D.teres) : 1L/ha

Classement :



Mention d'avertissement : **Danger**

**H373** : risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**H400** : Très toxique pour les organismes aquatiques.

**H410** : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Zone non traitée** : pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non-traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

**Délai de rentrée dans la parcelle** : 24 heures après traitement.

**Délai avant récolte** : 35 jours.

#### CONTACTS UTILES

Informations techniques FDS	BASF	N°Azur 0 810 02 30 33 ou <a href="http://www.agro.basf.fr">www.agro.basf.fr</a>
Une question de santé	MSA	Phyt'attitude N°Vert 0 800 887 887 APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF	Service Sécurité 24h/24 : 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0 810 12 18 85 ou <a href="http://www.adivalor.fr">www.adivalor.fr</a>

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>.

Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou [www.agro.basf.fr](http://www.agro.basf.fr)

® : marque déposée BASF - 10/2015 - Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. REF 643CFE1115OUEST

BASF France S.AS Division Agro - 21 chemin de la Sauvegarde - 69134 ECULLY Cedex - Tél. 04 72 32 45 45 - [www.agro.basf.fr](http://www.agro.basf.fr)