



The Chemical Company

# Pictor® Pro

## Fongicide colza et haricot vert

**Granulés dispersables  
contenant 500 g/kg de boscalid**

**Autorisation de vente n° 2050075**

### **Usages et doses autorisés :**

• Colza : sclerotinia, alternaria et phoma	0,5 kg/ha
• Haricot vert : sclerotinia, botrytis	1,0 kg/ha

Numéro de lot et date de fabrication : voir sur le bidon.

# 2,5 kg

**BASF Agro S.A.S.**  
21, chemin de la Sauvegarde  
F-69134 ECULLY cedex  
Tel : 04 72 32 45 45

### **PREPARATION DE LA BOUILLIE**

Bien lire les recommandations d'emploi à l'intérieur de ce livret

# Bonnes Pratiques Phytosanitaires

## 9 gestes responsables et professionnels

### AVANT L'APPLICATION



1

Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.



2

Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi avant utilisation.



3

Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).



4

Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.



5

Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).



6

Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler ses emballages dans le cadre des collectes Aivalor.

### PENDANT L'APPLICATION



7

Ne pas traiter les cours d'eau et fossés en eau.  
Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

### APRÈS L'APPLICATION



8

Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.



9

Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains.  
Prendre une douche.

PICTOR PRO est un nouveau fongicide des cultures de colza et de haricot vert appartenant à une nouvelle famille chimique, les carboxamides.

PICTOR PRO est un fongicide à action préventive efficace contre le sclerotinia, l'alternaria et le phoma du colza et contre le botrytis et le sclerotinia du haricot vert. Grâce à son nouveau mode d'action, PICTOR PRO offre une efficacité similaire sur les souches de sclerotinia sensibles ou résistantes à la carbendazime.

## CONDITIONS D'APPLICATION

### **COLZA : 0,5 kg/ha**

- **sclerotinia** : Appliquer à partir de la chute des premiers pétales.
- **alternaria** : Appliquer dès l'apparition des symptômes sur tige ou siliques. Une application positionnée contre le sclerotinia offre également une efficacité intéressante sur alternaria.
- **phoma** : Traiter en automne dès que les conditions sont favorables à la maladie (le colza est très sensible jusqu'au stade 4/6 feuilles), en fonction des recommandations émises par les SRPV.

### **HARICOT VERT : 1,0 kg/ha**

PICTOR PRO s'utilise en préventif, dans un programme à 2 applications :

- première application en tout début floraison,
- renouvellement 10 à 15 jours plus tard.
- Sur botrytis, PICTOR PRO s'utilise indifféremment en première ou en seconde application.
- En situation de forte pression de sclerotinia, PICTOR PRO s'utilise de préférence en seconde application, 10 à 15 jours après une application de RONILAN DF à 1,5 kg/ha en tout début floraison.
- Si un seul traitement est effectué, PICTOR PRO sera appliqué en tout début de floraison.

## RECOMMANDATIONS GENERALES

- Nombre maximal d'applications par saison : 2
- **Délais d'emploi avant récolte** : colza = 42 jours ; haricot vert = 7 jours.
- LMR : les limites maximales de résidus sont consultables à l'adresse suivante : <http://e-phy.agriculture.gouv.fr/wiphy/>

NB : Nous rappelons que toute utilisation pour un usage non autorisé à la vente est interdite et que tout usage non conforme à nos préconisations est sous l'entièvre responsabilité de son utilisateur.

Avant toute utilisation de PICTOR PRO, s'assurer de son adéquation avec votre filière de production et avec la réglementation officielle régionale.

## **COMPATIBILITE**

Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels. Consulter le site <http://e-phy.agriculture.gouv.fr/wiphy/>

## **PREPARATION DE LA BOUILLIE**

### **1 - PAR LE BAC INCORPORATEUR :**

Commencer le remplissage de la cuve en eau. **Verser PICTOR PRO dans le bac incorporateur vide, sans ajouter d'eau.** Actionner la vanne d'aspiration du produit vers la cuve tout en faisant fonctionner le système d'agitation. Rincer le bac incorporateur.

### **2- PAR LE TROU D'HOMME :**

Oter le filtre du trou d'homme. Pendant le remplissage de la cuve en eau, **verser lentement PICTOR PRO dans la cuve en faisant fonctionner le système d'agitation.**

Dans le cadre des bonnes pratiques agricoles, rincer 3 fois les emballages et verser l'eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur.

Laisser l'agitateur en fonctionnement pendant le trajet et jusqu'à la fin de la pulvérisation.

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

**Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.**

### **Pendant le stockage :**

- Conserver le produit uniquement dans le récipient d'origine, à l'abri de l'humidité, du gel, dans un endroit frais, à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

### **Pendant la préparation de la bouillie et en cours d'application :**

- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.
- En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Ne pas respirer les vapeurs, ni le brouillard de pulvérisation.

### **Eviter les rejets dans l'environnement :**

- Ne pas pulvériser à proximité des points d'eau (mares, cours d'eau, fossés...).
- Eliminer les fonds de cuve et les eaux de rinçage par épandage sur le champ après les avoir dilués 5 fois.

### **Après application :**

- Nettoyer très soigneusement et rincer le pulvérisateur aussitôt après le traitement.
- Immédiatement après l'application, changer de vêtements et rincer le visage et les mains à l'eau savonneuse.

## **EMBALLAGE VIDE**

Réutilisation interdite. Lors de l'utilisation du produit, rincer le bidon en veillant à verser l'eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. Eliminer les emballages vides via les collectes organisées par les distributeurs partenaires de la filière A.D.I.VALOR ou autre service de collecte spécifique.

### **Important :**

Avec de nombreux fongicides, il existe un risque général d'apparition de souches fongiques résistantes à la matière active. Pour diminuer le risque d'apparition ou de développement du phénomène de résistance, il est nécessaire de respecter les préconisations d'emploi (dose recommandée, cadence et séquences de traitements, conditions d'application...) et, chaque fois que possible, d'utiliser des produits à mode d'action différent en alternance ou en mélange. En dépit du respect de ces règles, on ne peut pas exclure une altération de l'efficacité du fongicide liée à ces phénomènes de résistance. De ce fait, nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuelles conséquences qui pourraient être dues à de telles résistances. Respectez strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé.

Conduisez sur ces bases, la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous facteurs particuliers concernant votre exploitation, tels que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales, la résistance des espèces...

Compte tenu de la diversité des législations existantes, il est recommandé, dans le cas où les denrées issues des cultures protégées avec cette spécialité sont destinées à l'exportation, de vérifier la réglementation en vigueur dans le pays importateur.

BASF Agro garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d'origine ainsi que leur conformité à l'autorisation de mise en marché du Ministère de l'Agriculture.

Toute reproduction du présent texte est interdite.

**La dernière version de cette étiquette est consultable sur [www.bASF-agro.fr](http://www.bASF-agro.fr)**



The Chemical Company

# Pictor® Pro

## Fongicide colza et haricot vert

**Granulés dispersables  
contenant 500 g/kg de boscalid**

**Autorisation de vente n° 2050075**

### **Usages et doses autorisés :**

• Colza : sclerotinia, alternaria et phoma	0,5 kg/ha
• Haricot vert : sclerotinia, botrytis	1,0 kg/ha

Numéro de lot et date de fabrication : voir sur le bidon.

# 2,5 kg

### **BASF Agro S.A.S.**

21, chemin de la Sauvegarde  
F-69134 ECULLY cedex  
Tel : 04 72 32 45 45

### **PREPARATION DE LA BOUILLIE**

Bien lire les recommandations d'emploi à l'intérieur de ce livret