

RÉUSSISSEZ VOTRE COLZA

REPRISE DE VÉGÉTATION






Caramba®,
l'étalon des
régulateurs colza



Pourquoi Caramba® ?

● Efficace pour contrôler la verse.



● Souple d'emploi de C2 à D2

Une souplesse d'emploi supérieure à celle de l'autre référence régulateur.

● Efficace sur la cylindrosporiose, les attaques tardives de phoma et l'oïdium.




Cylindrosporiose

Maladie préjudiciable sur certaines variétés sensibles (perte de rendement jusqu'à 6 q/ha). A contrôler dès la reprise de végétation pour ne pas laisser envahir plusieurs étages foliaires.



Oïdium

Essentiellement Sud de la France.



Caramba® : le régulateur qui donne plus de rendement.

- Maturité plus homogène, moins d'égrenage, moins d'humidité et d'impuretés.
- Récolte et traitements plus faciles.
- Plus de ramifications, plus de siliques.
- Plante saine.

Comment s'utilise-t-il ?

● À la reprise de végétation stades C2 à D2

- Risque fort de verse et/ou de maladies comme cylindrosporiose, attaques tardives de phoma, oïdium : **dose 1,2 L/ha (sans adjuvant).**
- Risque faible à moyen de verse et/ou de maladies comme cylindrosporiose, attaques tardives de phoma, oïdium : **dose 0,9 à 1 L/ha (sans adjuvant).**



● À l'automne stade 4 à 6 feuilles (stade optimal d'intervention contre l'élongation)

- Risque d'élongation prématuré du bourgeon terminal (semis trop dense, azote disponible trop important, temps poussant) et/ou risque phoma, cylindrosporiose, oïdium... : **dose 0,6 L/ha (4 feuilles) à 0,9 L/ha (à partir de 6 feuilles) (sans adjuvant)** selon le stade du colza.
- Sur phoma, appliquer Caramba®, lors des phases de contamination, en suivant les avertissements agricoles de la Protection des Végétaux.

L'étalon qui vous en donne + sur colza



Qu'est-ce que Caramba® ?

- **Marque déposée BASF** : Caramba®
- **Autorisation de vente** n° 9300020
- **Composition** : 60 g/L de metconazole
- **Formulation** : concentré soluble
- **Usages et doses autorisées sur crucifères oléagineux** :
 - Sclérotiniose, alternariose, cylindrosporiose, oïdium : 1,2 L/ha
 - Phoma : 0,9 L/ha
 - Régulation de la croissance : 1,2 L/ha
- **Classement toxicologique** :
 - Xn : nocif
 - R63 : risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant
 - AQUA : dangereux pour les organismes aquatiques
- **Délai avant récolte – DAR** : Colza 45 jours
- **Distance aux points d'eau** : non définie. Respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 mètres (cf Arrêté JO du 21/09/2006)
- **Délai de rentrée** : 6 heures (cf Arrêté JO du 21/09/2006)
- **Autres autorisations** : Blé, orge, seigle, avoine, triticales, pois protéagineux et de conserve, féverole, lupin et lin.
- **Contre indication éventuelle sur faune auxiliaire et abeilles** : L'association de Caramba® avec un insecticide de la famille des pyréthri-noïdes n'est pas autorisée durant la floraison et les périodes de production d'exudats. Il faut obligatoirement traiter avec la spécialité à base de pyréthri-noïde en premier et laisser un délai de 24 heures minimum entre les deux applications.