

RÉUSSISSEZ VOTRE COLZA

RÉGIONS NORD




Caramba® Star, l'excellence fongicide à la floraison



Pourquoi Caramba® Star ?

- **Un spectre d'efficacité inégalé,
un remarquable rapport qualité/prix.**
- Une protection rentable grâce à des gains de rendement réguliers.

Sclérotinia : efficacité et gain de rendement




2 essais BASF (sclérotinia résistant carbendazime)



SCLÉROTINIA :
efficacité et gain
de rendement

Alternaria : efficacité sur siliques bosselées




6 essais BASF - Applications sur siliques bosselées.



ALTERNARIA :
une excellente efficacité

Oïdium : efficacité et gain de rendement




6 essais BASF (application à l'apparition des symptômes) 2001-2007




OÏDIUM :
(essentiellement sud de la France)
efficacité et gain de rendement

Comment s'utilise-t-il ?

- 0,8 L/ha
- Contre sclérotinia, traiter dès la chute des premiers pétales (stade G1) soit 5 à 10 jours après l'apparition de la 1^{ère} fleur (stade F1).
- Contre alternaria, traiter à l'apparition des premières taches sur siliques.
- Contre oïdium, traiter dès l'apparition des premiers symptômes.



Stade G1



Stade G2

Caramba® Star

L'étalon qui vous en donne + sur colza



Qu'est-ce que Caramba® Star ?

- **Marque déposée BASF** : Caramba® Star
- **Autorisation de vente n°** 2010280
- **Composition** : 90 g/L de metconazole
- **Formulation** : concentré soluble
- **Usages et doses autorisées sur crucifères oléagineux** :
 - Sclérotiniose, alternariose, cylindrosporiose, oïdium : 0,8 L/ha
 - Phoma : 0,6 L/ha
 - Régulation de la croissance : 0,8 L/ha
- **Classement toxicologique** :
 - Xn : nocif
 - R63 : risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant
 - AQUA : dangereux pour les organismes aquatiques
- **Délai avant récolte - DAR** : Colza 45 jours
- **Distance aux points d'eau** : non définie. Respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 mètres (cf Arrêté JO du 21/09/2006)
- **Délai de rentrée** : 6 heures (cf Arrêté JO du 21/09/2006)
- **Autres autorisations** : Blé, orge, seigle, avoine, triticales, pois protéagineux et de conserve, féverole, lupin et lin.
- **Contre indication éventuelle sur faune auxiliaire et abeilles** : L'association de Caramba® Star avec un insecticide de la famille des pyréthri-noïdes n'est pas autorisée durant la floraison et les périodes de production d'exudats. Il faut obligatoirement traiter avec la spécialité à base de pyréthri-noïde en premier et laisser un délai de 24 heures minimum entre les deux applications.