



Dès l'automne,
placez vos céréales
sous haute protection herbicide

Pourquoi CELTIC® ?

- CELTIC® : un outil performant pour **élaborer, dès l'automne, des solutions complètes de désherbage**, en donnant la priorité à la gestion des graminées.
- CELTIC® : un **large champ d'action anti-dicotylédones** et une efficacité **anti-graminées** sur pâturin, agrostis et vulpin, valorisée dans le cadre de mélanges.
- CELTIC® : un produit **multi-cultures** homologué sur blé tendre d'hiver, orge d'hiver, triticale, blé dur d'hiver et seigle d'hiver.
- CELTIC® : un outil complémentaire dans la **prévention de la résistance des graminées** : grâce à un mode d'action original et différent de celui des "fops" ou des sulfonylurées anti-graminées, il favorise l'alternance ou l'association de modes d'action herbicides.
- CELTIC® : dès l'automne, limiter la concurrence en eau et en éléments nutritifs exercée par les adventices sur les céréales, c'est **préserver le potentiel de la culture** (jusqu'à 10 q/ha par rapport à un désherbage de printemps).

CELTIC®, champ d'efficacité à 2,5 L/ha (dicots avant 4/6 feuilles et graminées avant 2 feuilles)

Dicotylédones

alchémille	
arabette de thalius	
capselle	
coquelicot	
fumeterre	
gaillet	
géraniums sp	
lamiers	
matricaire	
miroir de Vénus	

myosotis	
pensée	
sanve	
séneçon	
stellaire	
véronique agreste	
véronique des champs	
véronique de Perse	
véronique f. de lierre	


Graminées

agrostis	
pâturin	
vulpin	

Pourquoi CELTIC® ? – Zoom sur graminées


Vulpin

■ En association avec de l'IPU



- Plus d'efficacité avec moins d'IPU
- Plus de régularité


■ En association avec OKLAR®



- Solution sans urée
- En positionnement précoce

Ray-grass

■ En association avec CTU



- Une association également intéressante sur ray-grass

Comment s'utilise CELTIC® ?

Période d'application :

- En pré-levée ou en post précoce* des blés tendres et orges d'hiver.
- En post-levée précoce* des triticales, blés durs d'hiver et seigles.

Seul ou associé ?

- **Associé*** : 2 L à 2,5 L/ha sur flore mixte graminées + dicots avec :
 - ✕ l'isoproturon (IPU) ou le chlortoluron (CTU)
 - ✕ les produits à base de flupyrsulfuron.
 - ✕ d'autres antigraminées (fops, sulfo...)

- **Seul** : de 2 L à 2,5 L/ha sur une large flore "dicots" et sur pâturins

* À partir du stade 2 feuilles (BBCH 12) de la culture

* Veiller à respecter les conditions d'emploi du partenaire (cultures, dose, stade, variétés...). Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur. Consulter le site <http://e-phy.agriculture.gouv.fr>

Exemple d'association :

CELTIC® +CTU : 2-2.5 L/ha + 1 800 g s.a./ha en prélevée ou à partir de 2 feuilles

vulpin		lamiers	
agrostis		matricaire	
pâturins		myosotis	
ray-grass		pensée	
alchémille		sanve	
capselle		séneçon	
coquelicot		stellaire	
gaillet		véroniques	
géraniums			

Qu'est-ce que CELTIC® ?

- **Composition** :
16 g/L de picolinafen
+ 320 g/L de pendiméthaline
- **Formulation** : suspension concentrée
- **autorisation de vente n°** 9900340
- **Dose homologuée** : 2,5 L/ha sur blé tendre d'hiver, orge d'hiver, blé dur d'hiver, seigle et triticales
- **Classement toxicologique** : N : dangereux pour l'environnement - Xi : irritant - R43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau - R50/53 : très toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- **Distance aux points d'eau** : 20 mètres
- **Délai d'emploi avant récolte (DAR)** : céréales : 90 jours
- **Délai de rentrée dans la parcelle** : 48 heures.

Avant toute utilisation de CELTIC® et de ses partenaires, s'assurer de leur adéquation avec la filière de production et avec les recommandations officielles régionales.