

Le fongicide incontournable sur colza



La dimoxystrobine associée à la référence boscalid


Germination




Elongation des tubes germinatifs



Infection



Croissance mycélienne




Action complémentaire

Jetset®

- 2 matières actives efficaces à modes d'action différents, très efficaces sur sclerotinia et alternaria
- Gains de rendements en présence de sclerotinia
- Nouvel emballage EcoPack 5L pour 10ha

L'efficacité sur sclerotinia et les gains de rendement

% Efficacité sur sclerotinia (attaque >35%) n=7




Jetset® fait preuve d'une excellente efficacité et permet des gains de rendement élevés.



L'efficacité sur alternaria et les gains de rendement

% Efficacité sur alternaria application au stade sclerotinia n=8




Jetset®, appliqué au stade sclerotinia, fait preuve d'une excellente efficacité préventive sur alternaria avec des gains de rendement.



Des gains de rendement

Gain de rendement en absence de sclérotinia (Q/ha) n=45



Dans 45 essais, on observe que Jetset® offre des gains de rendement (+2.9 q/ha) même en absence de sclérotinia soit un gain net de 83€/ha.



Alternaria sur silique



Sclerotinia



Sclerotinia sur tige

Protection utilisateur lors de la manipulation produit : gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4.

AVANT L'APPLICATION

- 1 Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
- 2 Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi.
- 3 Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
- 4 Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
- 5 Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
- 6 Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor.

PENDANT L'APPLICATION

- 7 Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

APRÈS L'APPLICATION

- 8 Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
- 9 Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
- 10 Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande le procédé Osmofilm® * Marque déposée Sté PANTEK France

Jetset®

- Autorisation de vente : N°2100037
- Composition : 200 g/L de dimoxystrobine et 200 g/L de boscalid
- Formulation : Suspension concentrée (SC)
- Usages et doses autorisés : Colza : sclérotinia et alternaria 0.5L/ha
Autres usages autorisés : navette et pastel
Tournesol : phoma et phomopsis à 0.4L/ha
- Classement : H302 : nocif en cas d'ingestion.
H317: peut provoquer une allergie cutanée.
H332: nocif par inhalation.
H351: susceptible de provoquer le cancer.
H361d: susceptible de nuire au fœtus.
H400: très toxique pour les organismes aquatiques.
H410: très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
- ZNT : 5m
- Délai avant récolte : 42 jours
- Délai de rentrée dans la parcelle : 48h
- Nombre maximum d'application : recommandation de 1 application par an et par parcelle
- Température maximale de stockage : +40°C



Attention

CONTACTS UTILES

Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF Agro	N°Azur 0 810 02 30 33 ou www.agro.bASF.fr
Une question de santé	MSA	N°Vert 0 800 887 887 APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0 810 12 18 85 ou www.adivalor.fr

* Marque déposée BASF Jetset® Attention - Novembre 2013 Réf. 997COFE1013NORD - Annule et remplace toutes les versions précédentes. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer avant toute application, auprès du N° Azur de BASF Agro qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Usages, doses, conditions et restrictions d'emploi : consulter www.agro.bASF.fr