

CEANDO®

LA SOLUTION FONGICIDE COMPLETE DU COMPLEXE PIED-FEUILLE DES CEREALES



Mars 2015

BASF
We create chemistry

Ceando : la performance sur septoriose et rouilles

Une performance confirmée et régulière

Ceando® contient l'époxiconazole, le triazole de référence sur septoriose et rouilles. Préventif et curatif, Ceando® vous apporte en toutes situations **efficacité et régularité** sur ces maladies les plus préjudiciables des blés.




Ceando : un produit unique pour réussir son T1


La maîtrise du risque dans un seul produit...

Quelles que soient les variétés semées, vous avez une solution contre les maladies les plus fréquentes et les plus préjudiciables de la montaison sans avoir à recourir aux mélanges ou associations.

Grâce à ses performances sur septoriose et rouilles, élargies au piétin-verse et oïdium, Ceando® constitue une solution idéale pour le premier traitement du programme fongicide.



En présence du complexe parasitaire septoriose et piétin-versé, Ceando® apporte des gains de rendement comparés à l'association référente.



En situation où seule la septoriose est présente, Ceando®, utilisé en T1 d'un programme, apporte des rendements élevés comparés aux références septoriose du marché.

Un seul produit sur toutes vos céréales

Autorisé sur blé tendre, blé dur, orge, triticale, seigle et avoine, Ceando® simplifie la construction des programmes de protection sur les exploitations «multi-céréales» et facilite la gestion des stocks sur l'exploitation.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

Ceando : Comment l'utiliser sur céréales?



1^{er} noeud

Au stade 1^{er}-2^{ème} noeud pour lutter contre le piétin-verse et les maladies foliaires précoces.



2^{ème} noeud

De 0,9 L/ha à 1,5 L/ha en fonction de la pression des maladies, du programme de protection envisagé et des maladies ciblées. En cas de risque ou de pression élevée de piétin-verse, la dose minimale de 1,2 L/ha sera recommandée.

EcoPack

Emballage plus pratique et plus sûr pour l'utilisateur et l'environnement



Gestion responsable des modes d'actions

Préserver et prolonger l'efficacité maximum des fongicides céréales.

- Utiliser les fongicides en préventif et respecter les doses préconisées.
- Limiter le nombre d'application par saison et par parcelle d'un même groupe de résistance croisée.
- Maintenir la diversité des modes d'action et des triazoles (Epoxiconazole, Metconazole...)
- Associer et alterner les partenaires des triazoles dans le programme (SDHI, Prochlorazole, Triazoles, Chlorothalonil, Strobilurines...)
- Mettre en œuvre des pratiques culturelles et agronomiques qui minimisent le développement des champignons pathogènes (rotation, labour, date de semis, gestion fertilisation azotée ...)

Ceando® : Marque déposée BASF

▪ Autorisation de vente : N° 2090172.

▪ Composition : 83 g/L d'époxiconazole + 100 g/L de métrafenone.

▪ Formulation : Solution concentrée (SC).

▪ Usages autorisés :

BLÉS : Septoriose, rouille brune, rouille jaune, piétin-verse, oïdium.

ORGES : Helmintosporiose, rhynchosporiose, rouille naine, piétin-verse, oïdium.

AVOINE : Rouille couronnée, piétin-verse, oïdium.

SEIGLE : Rhynchosporiose, rouille brune.

TRITICALE : Septoriose, rouille brune, rouille jaune, piétin-verse, oïdium.

▪ Dose homologuée : 1,5 L/ha.

▪ Nombre maximum d'application : 1/an.

▪ Classement :

Mention d'avertissement : Danger

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.



H351 : Susceptible de provoquer le cancer.

H360Df : Peut nuire au foetus et susceptible de nuire à la fertilité.

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Protection utilisateur lors de la préparation de la bouillie : gants en nitrile EN374, bottes, combinaison de travail polyester/coton (65 %/35 %) déperlante, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial, masque de type A2P3.

▪ Zone non traitée : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau.

▪ Délai de rentrée dans la parcelle : 6 heures après traitement.

▪ Délai avant récolte : 35 jours.

Pour lutter spécifiquement contre l'oïdium du blé, compte tenu du développement de souches résistantes à la métrafenone, il conviendra d'utiliser Ceando® en programme avec un autre mode d'action efficace sur ce pathogène aux doses appropriées.

Évolution réglementaire au 1^{er} Janvier 2015 - Avertissement :

Nouvelle mention de danger H360Df (peut nuire au foetus et susceptible de nuire à la fertilité) remplace H361fd (susceptible de nuire à la fertilité et susceptible de nuire au foetus)

- Interdiction de tout mélange avec une autre spécialité phytosanitaire (hors mélange autorisé).
- Interdiction d'emploi par des femmes enceintes ou allaitantes.

Pour les employeurs

- Réalisation d'une analyse bénéfices/risques à renseigner dans le Document Unique, pour substituer ou non la spécialité.

10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION

- 1 Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
- 2 Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi avant utilisation.
- 3 Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
- 4 Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
- 5 Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
- 6 Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve, ou utiliser l'incorporeur.

PENDANT L'APPLICATION

- 7 Ne pas traiter les cours d'eau et fossés en eau. Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

APRÈS L'APPLICATION

- 8 Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
- 9 Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
- 10 Recycler les emballages dans le cadre des collectes ADIVALOR. Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires. BASF France - Agro recommande Osmofilm®.

Contacts utiles

Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF France - Agro	• N°Azur 0 810 02 30 33 ou www.agro.bASF.fr
Une question de santé	MSA	Phyt'altitude • N° Vert 0 800 887 887
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF France - Agro	Service Sécurité 24h/24 : 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	• N°Azur 0 810 12 88 85 ou www.adivalor.fr

© Marque déposée BASF. OPUS® - Autorisation de vente n°2100182 - Composition : 83 g/L d'époxiconazole - Concentré émulsionnable (EC) - Classement : Danger – H319 – H315 – H332 – H351 – H360Df - H400 - H410. Usages et doses autorisées, conditions et restrictions d'emploi : consulter www.agro.bASF.fr.

Attention – Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi - Mars 2015 - Réf. 420CFE0115NORD - Annule et remplace toutes les versions précédentes. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer avant toute application, auprès du N° Azur de BASF Agro qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.