

# Tanaris® + Flamenco® CS


L'herbicide de pré-levée associant 4 matières actives qui offre le spectre anti-dicotylédones le plus large du marché.

## ■ Une solution rassurante

Une offre à base des 4 premières substances du marché pour assurer plus de sécurité et gérer les modes d'action.




## ■ Une solution adaptée aux conditions locales



- ▶ Efficace sur **flore simple** : Gaillet, Matricaire, Coquelicot.
- ▶ Avec une **action préventive sur Géraniums**.
- ▶ Avec une **large plage d'application**. **Souplesse d'utilisation** en post-semis pré-levée ou post-levée précoce pour s'adapter à toutes les conditions. (voir recommandations au verso)
- ▶ Avec une **efficacité racinaire**.

### Légende :





# Comment s'utilise Tanaris + Flamenco CS ?

TANARIS  
FLAMENCO CS

1 pack pour 5 à  
5,5 ha

FLAMENCO CS

TANARIS



- ♦ Dans la majorité des situations, **appliquer Tanaris + Flamenco CS en post-semis pré-levée.**
- ♦ En séquence, Flamenco CS s'applique en post-semis pré-levée du colza UNIQUEMENT et Tanaris en post-levée précoce.
- ♦ L'utilisation en séquence est recommandée en conditions difficiles : sol caillouteux ou très motteux ne permettant pas de recouvrir correctement les graines, sol très battant ou très filtrant, sol trop sec rendant la levée aléatoire, fortes précipitations à craindre dans les 2 - 3 jours qui suivent le semis, semis tardif. En séquence, Flamenco CS s'applique en post-semis pré-levée du colza et Tanaris en post-levée précoce.

N° Vert BASF

0 800 100 299

Service & appel  
gratuits

## Fiche d'identité produit

Tanaris® : marque déposée BASF. AMM : N° 2170158. Composition : 333 g/L de dmta-p + 167 g/L de quinmérac. Formulation : suspo-émulsion (SE). Usages et doses autorisés : Colza d'hiver, navette, cameline, moutarde : 1,5 L/ha .Entre les stades BBCH 00 et BBCH 18. Classement : Mention d'avertissement : Attention. SGH07 - SGH09 - H317 - H319 - H400 - H410. Zone aquatique et zone non cultivée adjacente : 5 mètres. Nombre maximum d'applications : 1 tous les 2 ans. Délai avant récolte : DAR F (BBCH 18). Délai de rentrée dans les parcelles : 48 heures après le traitement.

Flamenco® CS : marque déposée BASF. AMM : N° 2100185. Composition : 250 g/L de métazachlore + 33,3 g/L de clomazone. Formulation : ZC (formulation mixte SC [métazachlore] et CS [clomazone]). Usages et doses autorisés : Désherbage colza : 3 L/ha. Classement : Mention d'avertissement : Attention. SGH07 - SGH08 - SGH09 - H351 - H317 - H400 - H410. Zone aquatique et zone non cultivée adjacente: 5 mètres. Nombre maximum d'applications : 1 par an. Métazachlore : Ne pas dépasser la dose de 1000 g/ha de métazachlore sur une période de 3 ans en une ou plusieurs applications. Stade d'application : post-semis - pré-levée. Délai de rentrée dans les parcelles : 48 heures après le traitement.

Recommandations BASF sur colza d'hiver afin de protéger les ressources en eau : « Au-delà des aspects réglementaires et du bon respect des Bonnes Pratiques Agricoles, BASF recommande de respecter des conditions particulières d'emploi appliquées à certaines zones. Elles peuvent être précisées par des arrêtés préfectoraux ou par les Comités de pilotage des aires d'alimentation de captage. »

**Précautions lors de la préparation de la bouillie :** gants en nitrile EN374, bottes, Combinaison de travail ou ensemble veste-pantalon, dédié à la manipulation des produits phytopharmaceutiques, certifié norme ISO 27065 - niveau 1, blouse Cat III type PB 3 manches longues ,lunettes de sécurité ou écran facial. Porter des gants et un vêtement de protection approprié pendant les phases de mélange/chargement et d'application.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou [www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr) et/ou [www.phytodata.fr](http://www.phytodata.fr). 356COHE0418NORD Avril 2018. Annule et remplace toutes les versions précédentes. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer avant toute application, auprès du numéro Vert Basf France SAS Division Agro, qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

BASF France S.A.S Division Agro - 21 chemin de la Sauvegarde - 69134 ECULLY Cedex - Tél. 04 72 32 45 45 - [www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr)

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**