

Découvrez Adexar™ à base de Xemium®, SDHI de 3^e génération

>> Xemium®, c'est :

Une mobilité unique

- Curativité et longue durée d'action

Souplesse d'utilisation pour l'agriculteur

Un large spectre et un haut niveau de performances

- Sur blés et autres céréales
- contre septoriose et rouilles
- contre le complexe des maladies des orges

Un nouveau standard rendement est né pour un gain net encore jamais atteint.


>> Adexar™ c'est :

La combinaison optimisée de Xemium® et d'époxiconazole,
reconnue meilleure triazole contre le complexe septoriose et rouilles.


Un niveau de performance et de rendement net encore jamais atteint à la fois en blés et en orges aux doses recommandées.

Un nouveau standard rendement est né pour un gain net encore jamais atteint.

Une efficacité septoriose remarquable



Une bonne efficacité rouille brune



*Xemium®, nom d'usage de la substance active fluxapyroxad


Le spectre d'activité blés

	Septoriose	Rouille brune	Rouille jaune	Oïdium
Adexar™				
XEMIU®				
Réf.				

Le spectre d'activité orges


	Helminthosporiose	Rhynchosporiose	Rouille naine	Ramulariose
Adexar™				
XEMIU®				
Réf.				

Positionnement optimal d'Adexar™ dans les programmes blés



Pour mieux valoriser l'innovation Adexar™, il est préférable de l'utiliser du stade dernière feuille au stade épiaison, cœur du programme fongicides blés, soit le T2.

Positionnement optimal d'Adexar™ dans les programmes orges



Sur orges également, Adexar™, sera de préférence positionné sur le traitement "cœur de protection" de la feuille, c'est-à-dire en T2 d'un programme à 2 passages ou bien en traitement unique.

Adexar™, spécialité recommandée par les filières brassicoles Malteurs et Brasseurs de France.

Pression maladies	Moyenne	Forte
Potentiel culture	Classique	Elevé
BLES :	1 à 1,3L/ha	jusqu'à 2L/ha
ORGES :	0,8 à 1,2 l/ha	jusqu'à 2 l/ha

FICHE D'IDENTITE Adexar™

- **Autorisation de vente :** n° 2110170.
 - **Composition :** 62,5 g/l de fl uxapyroxad (Xemium®) + 62,5 g/l d'époxiconazole.
 - **Formulation :** concentré émulsionnable (EC).
 - **Usages autorisés :**
- BLÉS :** septorioses, oïdium, rouille brune et piétin-verse.
- ORGES :** rhynchosporiose, helminthosporiose (D. Terres) également autorisé sur ramulariose, rouille naine, oïdium, piétin-verse.
- AVOINES :** rouille couronnée, piétin-verse.
- SEIGLES :** rhynchosporiose, rouille brune, oïdium
- TRITICALE :** septorioses, rouille brune, oïdium, piétin-verse.
- **Dose autorisée :** 2 L/ha pour tous les usages autorisés.

■ Classement :

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.—**H302 :** Nocif en cas d'ingestion. —**H317 :** Peut provoquer une allergie cutanée.—**H351 :** Susceptible de provoquer le cancer.—**H361fd :** Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.—**H400 :** Très toxique pour les organismes aquatiques.—**H410 :** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- **Distance aux points d'eau :** respecter une Zone Non Traitée (ZNT) de 5 mètres.

- **Nombre maximum d'applications :** 1/an**.

- **Délai avant récolte :** 35 jours.

- **Délai de rentrée dans la parcelle :** 48 heures.

**Ne pas appliquer à la dose maximum homologuée plus d'une fois par an et par parcelle le produit Adexar™ ou tout autre produit à base d'une substance active du groupe des inhibiteurs du complexe mitochondrial (SDHI) afin de limiter le risque de résistance.



10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION

- 1 Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
- 2 Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi.
- 3 Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
- 4 Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
- 5 Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
- 6 Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor.

PENDANT L'APPLICATION

- 7 Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

APRÈS L'APPLICATION

- 8 Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
- 9 Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
- 10 Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande le procédé Osmofilm®

Contacts utiles

Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF Agro	N°Azur 0 810 02 30 33 ou www.basf-agro.fr
Une question de santé	MSA	Phytitude N° Vert 0 800 887 887 APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0810 12 18 85 ou www.adivalor.fr

Protection utilisateur lors de la manipulation produit : gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4.