



Weedazol®TL +



L'autre désherbage de vos vignes et de vos pommiers

→ Weedazol®TL : Action foliaire, systémique et lente

- Détruit la plupart des mauvaises herbes présentes, en particulier les dicotylédones difficiles, sélectionnées par l'usage exclusif et renouvelé de la même matière active.
- Par son action lente, il permet le positionnement de la pendiméthaline avant qu'elle ne prenne le relais.
- Sa faible dépendance vis à vis des conditions climatiques lui confère une bonne régularité d'action, en particulier en fin d'hiver.

→ Prowl®400 : Action racinaire

- Empêche la levée des graminées annuelles estivales (PSD) et dans le cadre d'un programme ou d'association avec Weedazol®TL, renforce son efficacité sur de nombreuses dicotylédones.
- Sa persistance empêche les nouvelles levées.
- Utilisé dans le respect des Bonnes Pratiques Agricoles, il présente peu de risque de transfert dans les eaux.

→ Weedazol®TL + Prowl®400 : des partenaires complémentaires

Destructions foliaires		Action de prélevée
Weedazol	15 l / ha	Prowl
Sortie Hiver		8 l / ha
Dicotylédones		
S	Erodium	
	Amarante réfléchie	S
MS	Carotte sauvage	MS
	Chénopode blanc	TS
TS	Erigeron	MS
TS	Géranium	MS
TS	Laiteron rude	MS
	Morelle	S
TS	Renouée des oiseaux	TS
	Renouée Persicaire	TS
TS	Séneçon	R
Vivaces		
S	Epilobe	MS
TS	Mauve	
S	Rumex	TS
Graminées		
	Digitaire	TS
	Panic	TS
TS	Pâturin annuel	TS
MS	Ray grass	
	Sétaire	TS
	Sorgho d'Alep	TS





Weedazol® TL + Prowl® 400

L'autre désherbage
de vos vignes et de vos pommiers

→ Conditions d'utilisation

Sur vigne :

Weedazol® TL + Prowl® 400 s'utilise en pré-débourement strict (avant le stade B).

Une application sur sol humide est recommandée.


Utilisation sur des vignes - de plus de 4 ans.

- dont les bourgeons sont distants de plus de 25 cm du sol.

Pour les vignes basses (entre 25 et 40 cm), arrêter les applications 3 semaines avant début gonflement des bourgeons.

Sur pommier :

Weedazol® TL + Prowl® 400 s'utilise en pré-débourement, mais, également en séquence : Weedazol® TL utilisé en sortie hiver sera suivi de Prowl® 400 + partenaire foliaire (Glyphosate ou Glufosinate) sur les nouvelles levées de mauvaises herbes en tenant compte du délai d'emploi avant récolte de 140j. pour Prowl® 400.



* : Les conditions de l'année influencent le développement de la vigne, adapter les dates de traitements en conséquence.

→ Fiche d'identité

AMM n° =	Prowl® 400	Weedazol® TL
Composition =	8900681 400 g/l de Pendiméthaline	6000067 240 g/l d'Aminotriazole, contient du Thiocyanate d'ammonium, synergiste spécifique de l'Aminotriazole
Formulation =	Suspension concentrée	Concentré soluble
Usage et dose =	Désherbage vigne-pommier 8 l/ha	Désherbage vigne-arbres fruitiers 15 l/ha
Classement toxicologique =	Non classé, Aqua	Xn R32 48/22 63 R52/53
Délai d'emploi avant récolte =	> 140 j	Vigne : 42 j Pommier : 35 j
Distance aux points d'eau =	Respecter une zone non traitée minimale de 5 m	5 m
Délai de rentrée =	6 h	24 h
Donc, 24 h pour le mélange		