

**Le partenaire indispensable
des produits de contact**



Pourquoi Rebell® T en post-levée ?

- **La référence technico-économique sur mercuriales, ombellifères, renouées liseron, gaillets, sanves, véroniques.**

Comment s'utilise-t-il ?

- Mercuriales et ombellifères : BTRV⁽¹⁾ et BTRSV⁽²⁾ (3 à 5 passages) offrent un très haut niveau d'efficacité en post-levée.
- Pour B, T, S et V, ajuster les doses selon les recommandations ITB et respecter les précautions d'emploi.
- Traiter le matin (hygrométrie, absence de vent), tous les 6 à 10 jours sur adventices jeunes (stade cotylédons à 2 feuilles).

Qu'est-ce que Rebell® T ?

- **Rebell® T** : Marque déposée BASF
- **Autorisation de vente** : n° 9000834
- **Composition** : 60 g/L de quinmérac + 360 g/L de chlqidazone.
- **Formulation** : Suspension concentrée
- **Classement toxicologique** :
 - Xi : Irritant
 - R36/38 : Irritant pour les yeux et pour la peau
 - R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
 - AQUA : Dangereux pour les organismes aquatiques
- **Usages et doses autorisées** sur betteraves industrielles et fourragères : 7 L/ha
- **Distance par rapport au point d'eau – ZNT** : Ne pas traiter à moins de 5 mètres d'un point d'eau.
- **Autres autorisations** : Cultures porte-graines mineures betteraves potagères, poirée et épinard : 3,5 L/ha (se référer aux préconisations FNAMS).
- **DAR** : 90 jours

Dose Rebell® T : 1 L/ha

	BTRV ⁽¹⁾	BTRSV ⁽²⁾
Amarante	■	
Agrostis	■	
Ambroisie		
Ammi élevé	■	■
Atriplex	■	
Capselle	■	
Chenopode	■	
Coquelicot	■	
Éthuse	■	
Euphorbe	■	
Fumeterre	■	
Gaillet gratteron	■	
Lamiers	■	
Laïteron des champs	■	
Lampsane	■	
Matricaire	■	■
Mercuriale	■	■
Morelle	■	
Mouron des oiseaux	■	
Mouron des champs	■	
Ortie royale	■	
Pâturn annuel		■
Pensée sauvage	■	
Ravenelle	■	
Renouée liseron	■	
Renouée persicaire	■	
Renouée des oiseaux	■	
Repousses de colza	■	
Sanve	■	
Véroniques	■	
Vulpin		■

■ Très efficace : 90 - 100%

■ Efficace : 80 - 90%

■ Moyennement efficace : 60 - 80%

(1) Dès 80 % des betteraves au stade cotylédons.

(2) À partir du T2 de post avec 100 % des betteraves levées. Ajout de S à BTRV recommandé en cas de temps sec en post sur ombellifères et mercuriales.

J'agis en professionnel responsable

