



Maîtrise les graminées et les dicots dès la pré-levée des Maïs grain et fourrage

Une solution très large spectre, graminées et dicots

- Gère les levées échelonnées grâce à sa persistance
- Dans la majorité des situations, satisfaction en 1 passage
- En cas de fortes pressions d'adventices, permet un désherbage raisonné en post-levée

	ATIC [®] AQUA (2 à 2,2 L/ha) + ISARD [®] (1 à 1,2 L/ha)		ATIC [®] AQUA (2 à 2,2 L/ha) + ISARD [®] (1 à 1,2 L/ha)		ATIC [®] AQUA (2 à 2,2 L/ha) + ISARD [®] (1 à 1,2 L/ha)
GRAMINÉES ESTIVALES		DICOTYLÉDONES DIFFICILES		DICOTYLÉDONES DIVERSES	
Digitaires sp.		Ambroisie à f. d'Armoise		Capselle bourse-à-pasteur	
Panic pied-de-coq		Arroches sp.		Colza (repousses)	
Setaires sp.		Datura stramoine		Lamier pourpre	
AUTRES GRAMINÉES ANNUELLES		Fumeterre officinal		Matricaire camomille	
Paturin annuel		Gaillet gratteron		Mouron des champs	
Ray-grass d'Italie		Laiterons sp. (issus de graines)		Pourpier potager	
Vulpin		Linaires sp.		Ravenelle	
DICOTYLÉDONES CLASSIQUES		Mercuriale annuelle		Rumex sp. (issus de graines)	
Amarantes sp.		Pensée des champs		Sanve	
Chénopodes sp.		Renouée des oiseaux		Séneçon commun	
Morelle noire		Renouée liseron		Stellaire	
Renouée persicaire (et à f. de Patience)		Véroniques sp.			

Très sensible (TS)	> 95 %
Sensible (S)	85-95 %
Moyennement sensible (MS)	70-85 %
Peu sensible (PS)	50-70 %
Très peu sensible (TPS)	< 50 %

Un haut niveau d'efficacité sur des dicots parfois très difficiles à contrôler


- La renouée des oiseaux
- Les véroniques
- Les pensées
- Un effet frein sur liserons



Une formulation micro-encapsulée d'Atic[®] Aqua , pour plus de confort à l'utilisation

- Base aqueuse de la formulation → pas d'odeur
- Opérations de nettoyage facilitées
- Relargage progressif de la matière active → actif plus longtemps

Préconisations



	ATIC® Aqua – 5 L	Isard® – 3 L
1 Twin pour 2,5 ha	2 L/ha	1,2 L/ha
1 Twin pour 3 ha	1,7 L/ha	1 L/ha

Fiche d'identité

ATIC AQUA® : marque déposée BASF

Autorisation de vente : n°2090011

Composition : 455 g/L pendiméthaline

Formulation : encapsulée (CS)

Classement toxicologique :

N : dangereux pour l'environnement
R50/53 : très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

Usages et doses autorisées :

2,6 L/ha tournesol, maïs, sorgho, millet, moha, miscanthus

Nombre maximum de traitements / an :

1 application par saison maximum

Délai avant récolte :

DAR grain : 120 jours

DAR ensilage et fourrage vert : 90 jours

Distance aux points d'eau

respecter une zone non traitée (ZNT) de 20 mètres

Délai de rentrée (Cf. Arrêté J.O. du 21/09/2006) :

6 heures



Isard® : marques déposées BASF

Autorisation de vente : n°9900251

Composition : 720 g/L de dmta-p

Formulation : EC

Classement toxicologique :

Xn : nocif – N : dangereux pour l'environnement

R22 : nocif en cas d'ingestion

R36/38 : irritant pour les yeux et pour la peau

R43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

R50/53 : très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

Usages et doses autorisées : maïs grain et fourrage, maïs doux 1,4 L/ha, sorgho 1,2 L/ha

Nombre maximum de traitements / an :

1 application tous les 2 ans. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer Isard® ou tout autre produit contenant du dmta-p plus d'une fois tous les 2 ans sur la même parcelle.

Délai avant récolte :

DAR maïs fourrage et sorgho : 90 jours, DAR maïs doux : 60 jours et DAR maïs grain : 100 jours.

Distance aux points d'eau:

Respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 mètres

Délai de rentrée: 48 heures

Protection utilisateur lors manipulation produit : **gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4.**