

STROBY DF en encadrement de floraison

Essais de sélectivité



- 3 traitements au sein d'un programme anti-oïdium en association avec un anti-mildiou
- notations sélectivité sur grappes dans le mois suivant la 3^{ème} application



Notation sélectivité* (note 0 à 100)	Année	2003	2004		2005		
	Lieu	Merville (31)	Merville (31)	Léognan (33)	Merville (31)	Merville (31)	St Pey (33)
	Cépage	Pinot noir	Cabernet Sauvignon	Cabernet Sauvignon	Cabernet Sauvignon	Chardonnay	Merlot
	Traitements	T1 = 28 mai T2 = 11 juin T3 = 25 juin	T1 = 2 juin T2 = 15 juin T3 = 29 juin	T1 = 28 mai T2 = 11 juin T3 = 25 juin	T1 = 31 mai T2 = 14 juin T3 = 28 juin	T1 = 18 mai T2 = 1 juin T3 = 15 juin	T1 = 25 mai T2 = 8 juin T3 = 21 juin
	Témoin	0	0	0	0	0	0
	Référence CEB	0	0	0	0	0	0
	Stroby DF	0	0	0	0	0	0
	Réf T	0					

*Note de sélectivité: 0 = aucun symptôme, 100 = culture détruite.

► dans les conditions de la pratique, Stroby DF est parfaitement sélectif de la vigne

Stroby®DF : marque déposée BASF. 50 % de krésoxim-méthyl- Autorisation de vente N° 9700214 – Xn nocif, R40, Aqua – Vigne: oïdium, black-rot : 0,2 kg/ha. Délai avant récolte: 35 j. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi.