

Stratos® Ultra



Anti-graminées
Champion toutes catégories



Pourquoi Stratos® Ultra ?

• Le spectre complet

Contre les graminées annuelles et vivaces :

Brome	Ray-grass
Chiendent	Repousses de blé
Digitaire	Repousses d'orge
Folle-avoine	Sétaire
Panic	Sorgho d'Alep
Paturin commun	Vulpin

• La polyvalence

Betterave	Luzerne
Carotte	Maïs Duo System*
Colza	Pois de conserve
Epinard	Pois protéagineux
Haricot	Pomme de terre
Lin textile	Soja
Tournesol	Trèfle violet

• Une efficacité régulière sur les graminées

- **Une grande rapidité d'action** : Stratos® Ultra est à l'abri du lessivage dans l'heure qui suit le traitement. En moins d'une semaine, les premiers symptômes sont visibles. Les graminées sont totalement détruites au bout de 3 semaines.

Comment s'utilise Stratos® Ultra ?

	Stades	Stratos® Ultra
Graminées annuelles	3 feuilles à début tallage	1,6 l/ha
	Tallage à montaison	2 l/ha
Graminées vivaces	Pousse de 10 à 20 cm	4 l/ha

En culture de betterave industrielle, sur graminées annuelles (1-3 feuilles); Stratos® Ultra peut s'utiliser à 1,2 l/ha ou en association avec les herbicides de post-levée.

Les meilleures efficacités sont obtenues en traitant à un stade jeune des graminées adventices (avant plein tallage) et en conditions poussantes (hygrométrie et temps doux).

Stratos® Ultra


BASF
The Chemical Company

Anti-graminées
Champion toutes catégories



Positionnement du Stratos® Ultra

Graminées Annuelles



Stratos® Ultra s'utilise de préférence au stade jeune des adventices.
Les meilleures efficacités sont obtenues par temps poussant.

Graminées Vivaces



Un ralentissement des adventices
est déjà noté dès 2 l/ha.

10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION

- 1 Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé. ✓
- 2 Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi. ✓
- 3 Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes). ✓
- 4 Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application. ✓
- 5 Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse). ✓
- 6 Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor. ✓

PENDANT L'APPLICATION

- 7 Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments. ✓

APRÈS L'APPLICATION

- 8 Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle. ✓
- 9 Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche. ✓
- 10 Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande le procédé Osmofil®
* Marque déposée SNE PANTHE France ✓

Fiche d'identité



Stratos Ultra : marque déposée BASF

Autorisation de vente n° 9000490

Composition : 100 g/l cycloxydime

Formulation : EC

Usages et doses autorisés : épinard 2 l/ha - riz 4 l/ha - betteraves industrielles et fourragères, colza, feveroles, lin textile, luzerne, maïs, pois protéagineux, pomme de terre, soja, tournesol, asperge, carotte, céleri, chou, haricot, laitue, poireau, pois de conserve, trèfle violet, tomate, vigne (culture installée) 2 ou 4 l/ha.

Classement toxicologique : Xi : irritant. R38 : irritant pour la peau. R65 : nocif ; peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. R67 : l'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. R52/53 : nocif pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Délai avant récolte (DAR) : laitue 21 j, haricot 28 j, carotte, épinard, pois écossé 42 j, poireau, feverole, pois protéagineux 56 j, tomate, chou 60 j, maïs fourrage, pomme de terre 70 j, lin textile, maïs grain, colza 90 j, soja 100 j, asperge 200 j

Distance au point d'eau : respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 m

Délai de rentrée dans la culture : 24 heures

Protection de l'utilisateur lors de la manipulation du produit : porter des gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable A2P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4.

Décembre 2010 - annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du n° azur de BASF Agro 0810 023 033 qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi, lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation.

Contacts utiles

Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF Agro	N°Azur 0 810 02 30 33 ou www.basf-agro.fr
Une question de santé	MSA	Phyt'Attitude N° Vert 0 800 887 887 APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0810 12 18 85 ou www.adivalor.fr