

Stroby® DF

La solution gagnante contre l'oïdium

Performant

- Efficacité de haut niveau contre oïdium.
- Excellente résistance au lessivage (après séchage de la bouillie sur la feuille).
- Respect des typhlodromes.
- S'inscrit dans les programmes de production raisonnée.

Polyvalent

- Stroby DF est autorisé contre oïdium, black rot, excoriose et brenner.

Souple

- Contre oïdium, la dose de Stroby DF s'adapte à la cadence d'utilisation recherchée.

Pratique

- Formulation WG.
- Emballage pour 3 à 4 ha selon cadence recherchée.

Préconisation d'emploi

Stroby DF peut s'utiliser durant toute la période de risque oïdium, et jusqu'à 35 jours avant la récolte.

A appliquer en préventif.

Cadence : la dose d'emploi de **Stroby DF** peut être modulée :


- 0.2 kg/ha pour une cadence jusqu'à 14 jours
- 0.15 kg/ha pour une cadence jusqu'à 12 jours

Stroby DF est particulièrement adapté à la gestion des phases critiques de sensibilité de la vigne à l'oïdium, c'est à dire entre début floraison et nouaison.

Dans le cadre des stratégies de lutte qui privilégient les premières interventions entre les stades 7-12 feuilles (selon cépage et région), des premières attaques peuvent s'être déjà potentiellement développées, et il est primordial d'utiliser un produit parmi les plus efficaces comme **Stroby DF**.

En cas de forte pression d'oïdium ou de pousse très rapide de la vigne, réduire la cadence à 10-12 jours en gardant la dose de 0.2 kg/ha.

Le nombre de traitements avec **Stroby DF** doit être de 2 à 3 par saison, en incluant toutes les strobilurines et fongicides assimilés (Qol).



Fiche d'identité



Stroby® DF : marque déposée BASF

Autorisation de vente N° : 9700214

Composition : 50 % krésoxim-méthyl

Formulation : granulés dispersables

Conditionnement : 0,6 kg

Usages et doses autorisées : Vigne, oïdium, black-rot, rougeot parasitaire : 0,2 kg/ha ; exchoriose : 0,02 kg/hl

Classement toxicologique : Xn, nocif. R40 : effets cancérogènes suspectés, preuves insuffisantes, Aqua : dangereux pour les organismes aquatiques.

Délai emploi avant récolte : 35 jours

Limite Maximale en Résidus : Raisin : 1 mg/kg

Distance aux points d'eau : respecter une zone non traitée de 5 m.

Délai de ré-entrée : non fixé, recommandation BASF Agro : 6 h

Stroby® DF est également autorisé sur olivier.

Protection utilisateur lors de la préparation de la bouillie : gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4.

Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi.