

La solution pour atteindre le rendement et la qualité

sunorg[®] pro : Optimiser son emploi

D.A.R.* CEREALES = 35 jours

* D.A.R. : délai avant récolte




La seule triazole anti-fusariose efficace sur Septoriose et Rouille brune

→ Pour une protection fongicide de qualité, optimisez l'emploi de Sunorg[®] Pro : la bonne dose au bon stade

→ Exemple : pour une cible fusariose, utilisez Sunorg[®] Pro entre 1L et 0,8L/ha dès le début floraison (étamines visibles)

★ **Fiche d'identité Sunorg[®] Pro :**



Cultures	Usages	Doses
Blé tendre d'hiver, Blé dur d'hiver	Fusarioses des épis, septorioses, rouilles brune et jaune, oïdium	1 l/ha
Orge d'hiver Orge de printemps	Rouille naine, rynchosporiose, oïdium	1 l/ha
Seigle	Rouille brune, rynchosporiose	1 l/ha
Avoine	Rouille couronnée	1 l/ha
Triticale	Rouille brune, septoriose	1 l/ha
Pois, lupin, féverole	Anthraxnose, pourriture grise, rouille	0,8 l/ha
Féverole	Sclérotinia	0,8 l/ha
Colza	Phoma	0,6 l/ha
	Régulation de la croissance	0,8 l/ha
	Cylindrosporiose, oïdium, alternaria, sclérotinia	0,8 l/ha



La solution pour atteindre le rendement et la qualité

Qu'est-ce que SUNORG® Pro ?

Sunorg® Pro : marque déposée BASF

Autorisation de vente n° : 2010280

Composition : 90 g/l de metconazole

Formulation : concentré soluble (SL)

Usages et doses autorisées :

Blé : fusariose des épis, septorioses, rouille brune, rouille jaune, oïdium : 1 l/ha

Orge : rhynchosporiose, oïdium, rouille naine : 1 l/ha

Avoine : rouille couronnée : 1 l/ha

Seigle : rhynchosporiose, rouille brune : 1 l/ha

Triticale : rouille brune, septorioses : 1 l/ha

Colza : phoma du colza : 0,6 l/ha

– sclérotiniose, alternariose, cylindrosporiose, oïdium : 0,8 l/ha

– régulation de la croissance du colza d'hiver : 0,8 l/ha

Féverole : – anthracnose, pourriture grise, rouille, sclérotiniose : 0,8 l/ha

Lupin : anthracnose, pourriture grise, rouille : 0,8 l/ha

Pois (protéagineux et de conserve) : – anthracnose, pourriture grise (botrytis), rouille : 0,8 l/ha

Lin : régulation de la croissance : 0,8 l/ha

Nombre maximum d'application par an : Pois protéagineux, de conserve, féverole, lupin et lin : 2

Classement toxicologique : Xn-nocif ; N - dangereux pour les organismes aquatiques ; R63 : Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant ; R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

LMR européennes : Metconazole

céréales grains sauf blé : 0,1 mg/kg ; blé : 0,15 mg/kg ; colza : 0,1 mg/kg ; lin 0,05 mg/kg ; pois de conserve, pois prot. : 0,05 mg/kg ; lupin : 0,05 mg/kg ; féverole : 0,02 mg/kg

Distance aux points d'eau : Respecter une zone non traitée (ZNT) minimale de 5 m (cf Arrêté du 21/09/06).

Délai de rentrée : 6h (cf Arrêté du 21/09/06)

DAR : Céréales : 35 jours ; Colza et lin : 45 jours ; Pois protéagineux, féverole, lupin : 28 jours ; Pois de conserve : 14 jours

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi, lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation. Mai 2011 – Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF Agro qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

REF : 279FCEFG0511OUEST



10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION

- 1 ▶ Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé. ✓
- 2 ▶ Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi. ✓
- 3 ▶ Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes). ✓
- 4 ▶ Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application. ✓
- 5 ▶ Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse). ✓
- 6 ▶ Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor. ✓

PENDANT L'APPLICATION

- 7 ▶ Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments. ✓

APRÈS L'APPLICATION

- 8 ▶ Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle. ✓
- 9 ▶ Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche. ✓
- 10 ▶ Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande le procédé Osmofilm®. ✓

Contacts utiles

Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF Agro	N°Azur 0 810 02 30 33 ou www.basf-agro.fr
Une question de santé	MSA	Phyt'attitude N° Vert 0 800 887 887 APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0810 12 18 85 ou www.adivalor.fr