

Tournesol : Les 4 facteurs clés pour obtenir Rendement et Qualité à la récolte



Viser une densité élevée dès le semis : prendre en compte les pertes à la levée qui sont de l'ordre de 20 % en moyenne et qui peuvent atteindre parfois plus de 35 % !

4 à 5 q/ha préservés

Désherber avec soin :

- Adapter la solution herbicide à la flore attendue sur la parcelle
- Biner en complément

5 q/ha préservés


Phomopsis : combiner choix variétal et lutte fongicide

10% de plantes avec une tache encerclante de phomopsis sur la tige suffisent à faire perdre 1 à 3 q/ha et 1 point d'huile.

Bénéfice de la protection fongicide contre le phomopsis et le phoma

9 essais en pression maladies moyenne à forte

Rendement en q/ha



8 à 10 q/ha préservés


Apporter systématiquement du Bore en végétation dans les situations suivantes :

- Sols peu profonds (ex. coteaux) et rotations courtes (1 an sur 2 ou 3)
- Sols où une carence en Bore a déjà été observée

Efficacité et rendement

Bénéfice d'un apport de bore avec la protection fongicide contre le phomopsis

1 essai 2012



Classe 0: tige saine
Classe 1: tige portant 1 ou des taches non encerclantes
Classe 2: tige portant au moins 1 tache encerclante
Classe 3: tige portant 1 manchon brun ou tige cassée

