

• Composition

C'est un bidon associatif qui contient :

5L FORKA® et 2,4L ISARD®

400 g/l de pendiméthaline

720 g/l dmta-p




• La pré-levée spectre large

Efficacité graminées

Large spectre dicots y compris certaines dicots difficiles comme la Renouée des oiseaux

Persistance renforcée

Résultats 2003-2006
: observations 60
jours après
application




Twin Forka+Isard (1 twin pour 2 à 2,25 ha) Réf. 5 (5 L/ha)

• Comment l'utiliser :

1 carton = 2 twins

La dose du Twin FORKA® + ISARD® pourra être raisonnée en fonction de la stratégie de traitement envisagée et des données pédo-climatiques.

FORKA® + ISARD®	FORKA® + ISARD®
1 Twin pour 2 ha	2,5 l/ha + 1,2 l/ha
1 Twin pour 2,25ha	2,2 l/ha + 1,1 l/ha
1 Twin pour 2,5 ha	2 l/ha + 1 l/ha



- Twin Forka® + Isard® s'utilise en post semis pré-levée
- Utilisable en post-levée précoce en association, si les conditions de post-semis pré-levée sont défavorables.

FORKA® et Isard® : marques déposées BASF.

Autorisation de vente :

- FORKA® : n°2040197
- Isard® : n°2010617

Composition :

- FORKA® : 400 g/L pendiméthaline
- Isard® : 720 g/L de dmta-p

Formulation :

- FORKA® : SC
- Isard® : EC

Classement toxicologique :

- FORKA® : N : dangereux pour l'environnement - Xi : irritant - R50/53 : très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques. R43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- Spectrum® : Xn : nocif - N : dangereux pour l'environnement - R22 : nocif en cas d'ingestion - R36/38 : irritant pour les yeux et la peau - R 43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau R50/53 : très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques - Peut entraîner des réactions allergiques

Usages et doses autorisées :

- FORKA® : maïs, sorgho 3 L/ha, nombreuses autres homologations
- Isard® : maïs grain/fourrage/doux 1,4 L/ha, sorgho 1,2 L/ha

Nombre maximum de traitements / an :

- FORKA® : 1 application par saison maximum
- Isard® : 1 application par saison maximum

Délai avant récolte :

- FORKA® : DAR sorgho : 90 jours
- Isard® : DAR maïs et sorgho : 90 jours
DAR maïs doux : 60 jours

Distance aux points d'eau :

- FORKA® : respecter une zone non traitée (ZNT) de 20 mètres
- Isard® : respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 mètres (Cf. Arrêté J.O. du 21/09/2006)

Délai de rentrée :

- FORKA® : 48 heures
- Isard® : 48 heures
(Cf. Arrêté J.O. du 21/09/2006)