



The Chemical Company

Twin FORKA® + Isard® solution de Pré-levée Maïs

Qu'est ce que Twin FORKA® + Isard® ?




1 Twin FORKA® + Isard®

Twin FORKA® + Isard®
pour désherber
MAÏS ENSILAGE et MAÏS GRAIN
2 ha par Twin

Sur flore mixte type
Nord de la France

Dose préconisée :
FORKA® 2,5 L/ha
+
Isard® 1,2 L/ha



Twin FORKA® + Isard® c'est :

UNE SOLUTION A LARGE SPECTRE SUR LES DICOTYLEDONES ET GRAMINEES

UN HAUT NIVEAU D'EFFICACITE SUR DES DICOTYLEDONES PARFOIS TRES
DIFFICILE A CONTROLER (renouée des oiseaux, véroniques, pensées)

UNE BONNE GESTION DES LEVEES ECHELONNEES GRACE A SA PERSISTANCE

MOINS DE 1000 g DE DMTA-P PAR HECTARE

DANS LA MAJORITE DES SITUATIONS, SATISFACTION EN UN PASSAGE



The Chemical Company

Twin FORKA® + Isard®

Twin FORKA® + Isard® : aussi performant que Wing®

Dicotylédones

	(nb. résult.)	Témoin (pl./m²)	Wing® 4	FORKA® + Isard® 2,5 + 1,2
Amarante réfléchie	(5)	14	89.0	86.8
Arroche hastée	(1)	6	100.0	100.0
Capselle	(1)	77	90.7	96.0
Chénopode blanc	(13)	15	92.2	89.0
Chénopode hybride	(2)	76	99.8	99.8
Datura	(1)	10	97.3	96.0
Fumeterre	(1)	4	90.7	93.3
Linaire bâtarde	(1)	3	100.0	97.3
Matricaire	(3)	5	100.0	100.0
Mercuriale	(3)	16	79.2	81.7
Morelle	(6)	68	94.4	96.1
Renouée des oiseaux	(3)	5	95.6	96.7
Renouée liseron	(2)	6	86.3	90.0
Renouée persicaire	(8)	15	77.8	74.2
Sanve	(2)	8	99.8	95.2
Séneçon	(3)	16	90.0	94.1
Véroniques	(4)	9	99.8	100
Pensée	(1)	40	60	60

Graminées

	(nb. résult.)	Témoin (pl./m²)	Wing® 4	FORKA® + Isard® 2,5 + 1,2
Digitaire sanguine	(4)	55	88.8	83.6
Panic pied de coq	(7)	21	94.4	94.8
Pâturin annuel	(2)	71	94.0	97.0
Repousse de blé	(1)	7	92.3	94.7
Sétaire d'Italie	(1)	10	96.3	92.3
Sétaire verticillée	(4)	37	68.7	65.7

Synthèse France 17 essais 2007 notation moyenne dicotylédones et graminées.
Observations 60 jours après application.

FORKA® et Isard® : marques déposées BASF.

Autorisation de vente :

- FORKA® : n°2040197
- Isard® : n°9900251

Composition :

- FORKA® : 400 g/L de pendiméthaline
- Isard® : 720 g/L de dmtp-p

Formulation :

- FORKA® : SC
- Isard® : EC

Classement toxicologique :

- FORKA® : N : dangereux pour l'environnement – R50/53 : très毒ique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques
- Isard® : Xn : nocif – AQUA : dangereux pour les organismes aquatiques – R22 : nocif en cas d'ingestion – R36 : irritant pour les yeux – R43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Usage et doses :

- FORKA® : sorgho 3 L/ha, nombreuses autres homologations
- Isard® : maïs grain et fourrage, maïs doux 1,4 L/ha, sorgho 1,2 L/ha

Nombre maximum de traitements / an :

- FORKA® : 1 application par saison maximum
- Isard® : 1 application par saison maximum

Délai avant récolte :

- FORKA® : DAR sorgho 90 jours
- Isard® : DAR maïs et sorgho : 90 jours – maïs doux : 60 jours

Distance aux points d'eau :

- FORKA® : ZNT 5 m

- Isard® : ZNT 5 m

Délai de rentrée :

- FORKA® : 6 heures
- Isard® : 48 heures (cf. arrêté JO du 21/09/07)

Protection utilisateur lors de la manipulation produit : gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4

BASF Agro S.A.S. – 21, chemin de la Sauvegarde – 69134 Ecully Cedex – Tél. 04 72 32 45 45

Retrouvez l'ensemble de nos informations produits sur www.bASF-agro.fr

N'Azur 0 810 023 033