


Vision®

Vue dégagée dans votre programme
Tavelure, Oïdium...

La combinaison unique de deux matières actives
pour une stratégie d'alternance contre Tavelure
et Oïdium du pommier.



Fongicide pommiers

 **BASF**
The Chemical Company

Vision® : la sécurité contre Tavelure et Oïdium.



La synergie de deux modes d'actions biochimiques différents.

- Le PYRIMÉTHANIL agit par contact et vapeur; il pénètre rapidement dans la plante grâce à ses propriétés translaminaires.

En présence de PYRIMÉTHANIL, la sécrétion par le champignon des enzymes nécessaires à la destruction de la membrane cellulaire de la plante est inhibée : la contamination ne peut se réaliser.

- Le FLUQUINCONAZOLE est fortement résistant au lessivage; son absorption est plus lente et continue. Systémique, la molécule se répartit de façon régulière dans le flux de sève. Le FLUQUINCONAZOLE inhibe la biosynthèse de l'ergostérol, perturbant ainsi le fonctionnement et la formation des membranes du champignon.

LES AVANTAGES DE VISION® DANS VOS PROGRAMMES TAVELURE + OÏDIUM :

- Ses deux molécules assurent une excellente couverture des feuilles et des fruits et sont à l'abri du lessivage = **SÉCURITÉ & TRANQUILLITÉ**.
- Il permet l'alternance des modes d'action (avec les strobilurines, etc...) = **PLUS DE SÉCURITÉ**.
- VISION est efficace contre Tavelure et Oïdium et ne nécessite donc pas de mélange = **PLUS PRATIQUE**.
- Il possède une activité curative de 48 heures = **PLUS DE SÉCURITÉ**.
- Il est neutre vis-à-vis de la faune auxiliaire.
- Il est sélectif de toutes les variétés de pommier et n'est pas rugogène.

Préconisations d'emploi

VISION s'emploie pendant toute la période de sensibilité à la Tavelure et à l'Oïdium, du stade C-C3 jusqu'à 28 jours de la récolte, dans la limite de trois traitements par an. Appliquer VISION sur un feuillage sec durant la période de risque* en tenant compte de la pression de la maladie, des conditions climatiques et de la croissance du végétal. Construire le programme en alternant les modes d'actions.

DOSE : 0,1 l / hl.

* En fonction des Avertissements agricoles et des modèles et en tenant compte de la persistance d'action réelle du produit précédent dans le programme.

TOUJOURS PRIVILÉGIER LES APPLICATIONS PRÉVENTIVES, dans le cadre d'un programme raisonné sur la prévision des risques et l'anticipation des épisodes contaminants.

- Persistance d'action (préventivité): 7 jours
- Curativité : 48 heures après le début de la pluie contaminatrice.

COMPOSITION

50 g/l de FLUQUINCONAZOLE + 200 g/l de PYRIMÉTHANIL

FORMULATION

Suspension concentrée

AUTORISATION DE VENTE

N° 9600098

Oïdium et Tavelure du pommier à 0,1 l / hl

CLASSEMENT TOXICOLOGIQUE

Xn : nocif - R22-R40-Aqua

DÉLAI D'EMPLOI AVANT RÉCOLTE

28 jours

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 litres

