

Zebra[®], la force irrésistible du désherbage colza



Pourquoi Zebra[®] ?

La force herbicide graminées et dicots

- **Zebra[®] est efficace sur plus de 30 adventices**
très répandues dans les cultures de colza.
- **Zebra[®] a une efficacité renforcée** sur le gaillet, la matricaire, les crucifères (capselle, sisymbre), le vulpin et le ray-grass.

Dicotylédones

- Alchémille
- Arabette
- Capselle bourse à p.
- Céraiste
- Chénopode
- Coquelicot
- Ethuse
- Jonc des crapauds
- Laiteron sp
- Lamier pourpre
- Lampsane commune
- Matricaire
- Miroir de vénus
- Morelle
- Myosotis des champs
- Passerage
- Séneçon vulgaire
- Sisymbre
- Stellaire
- Tabouret des champs
- Véronique de Perse

90 à
100%

- Carotte sauvage
- Diplotaxis
- Gaillet gratteron
- Rapistre
- Renoncule
- Shérardie
- Torilis
- Véronique f. de lierre
- Euphorbe sp
- Fumeterre
- Géranium mou
- Mercuriale
- Ravenelle
- Sanve
- Barbarée
- Calépine
- Géranium disséqué
- Géranium à f. ronde
- Géranium tige grêle
- Pensée
- Scandix

80 à
89%65 à
79%

< 65%

Graminées

- | | |
|------------------|--------------|
| • Pâturin annuel | 90 à
100% |
| • Ray-grass | |
| • Vulpin | 80 à
89% |
| • Folle avoine | 65 à
79% |
| • Brome stérile | |
| • Repousses blé | |
| • Repousses orge | < 65% |

- **Zebra[®] est particulièrement respectueux des cultures suivantes.**

De nombreuses cultures sont possibles en cas de retournement accidentel du colza (sécheresse, limaces) :

- **sans labour** : colza d'hiver et de printemps, maïs, tournesol, pois de printemps, féverole, lin, pomme de terre, soja.
- **après labour** : orge de printemps, blé de printemps, avoine, betteraves, graminées fourragères (sauf ray-grass), luzerne, trèfle.

A qui s'adresse-t-il ?

Aux colzaïculteurs qui recherchent :


- **un désherbage en un passage* ou en programme.**
- **un désherbage à spectre large avec une bonne efficacité**
y compris sur gaillet, matricaire, crucifères (capselle, sisymbre...), vulpin et ray-grass.
- **un désherbage en toute sécurité pour les cultures suivantes.**

*seules les fortes infestations de repousses de céréales nécessiteront l'application d'un anti-graminées de post-levée (type Stratos® Ultra + Dash® HC).

Comment s'utilise-t-il ?

- Zebra® s'utilise sans incorporation en post-semis, pré-levée du colza, dès le semis pour profiter de l'humidité du sol ou dans les jours qui suivent et avant la levée des premiers pieds de colza.
- Zebra® peut être utilisé en programme avec un produit de pré-semis :
 - dans les régions où la trifluraline (2,5 L/ha de produit commercial) est appliquée en pré-semis incorporé (8-10 cm), Zebra® s'utilise de 2,5 L à 3 L/ha.
 - en cas de forte infestation de géraniums (ex : napropamide, conditions optimales d'utilisation : pré-semis incorporé à 2-4 cm).

Herbicide colza de post-semis / pré-levée



Evitez la dérive de la pulvérisation sur les cultures voisines. Ne pas traiter à moins de 100 m d'un vignoble.

Qu'est-ce que Zebra® ?

- **Autorisation de vente :** n° 2000085
- **Composition :** 250 g/L de métazachlore + 33 g/L de clomazone
- **Formulation :** Suspo-émulsion
- **Classement toxicologique :** Xi - R43 - AQUA
- **Usage et dose autorisée :** 3 L/ha
- **Délai avant récolte :** > 100 jours
- **ZNT :** Respecter une zone non traitée de 10 mètres par rapport aux points d'eau.

- **Délai de ré-entrée :** Dans l'attente de la révision des substances actives (directive 91/414/CEE) et sans notification officielle pour le produit, les adhérents de l'UIPP recommandent de suivre l'avis de la Commission d'Etude de la Toxicité pour les délais minimum à respecter : soit 48h

