

Régulateur céréales

MEDAX® TOP

Le régulateur céréales alliant souplesse d'utilisation et haut niveau de performance contre la verse

■ **Efficacité anti-verse de très haut niveau :**

Medax® Top sécurise le rendement et la qualité de la récolte

■ **Simplicité d'utilisation :**

un seul régulateur pour toutes les céréales, large période d'application

■ **Sérénité d'utilisation :**

efficacité peu dépendante des conditions météo

MEDAX® TOP SÉCURISE LE RENDEMENT ET LA QUALITÉ DE LA RÉCOLTE

Très haut niveau d'efficacité anti-verse sur blés et orges

■ **BLÉS** 12 essais BASF versés - Application 1-2 nœuds



Rendement 87 q/ha



Rendement 95 q/ha

Témoin

Medax® Top 0,8 L/ha

+8 q/ha
VS
TÉMOIN

■ **ORGES** 7 essais BASF versés - Application 1-2 nœuds



Rendement 84 q/ha

Témoin


Medax® Top 0,8 L/ha
+ Éthéphon 0,4 L/ha

Rendement 91 q/ha

+7 q/ha
VS
TÉMOIN

MEDAX® TOP, LA SIMPLICITÉ D'UTILISATION

■ **LARGE PÉRIODE D'APPLICATION :**
efficace dès épi 1 cm sur blés



■ **UN SEUL RÉGULATEUR**
pour toutes les céréales (blés, orges, avoines, seigle, tritacale)

Souplesse d'emploi



Blé tendre d'hiver



Risque faible à moyen
Risque moyen à fort



Orge d'hiver
Orge de printemps
Triticale

Éthéphon

MEDAX® TOP, LA SÉRÉNITÉ D'UTILISATION

EFFICACITÉ PEU DÉPENDANTE DES CONDITIONS MÉTÉO :

- Medax® Top est efficace **dès 8°C** (10°C pour le trinéxapac-éthyl)
- Medax® Top est efficace même en situation de faible luminosité

Appliquer Medax® Top sur des céréales en bon état végétatif : éviter les périodes de stress hydrique, de faim d'azote et de carence.



DES ATOUTS GRÂCE À LA SYNERGIE ENTRE PROHÉXADIONE & MEPIQUAT

Meilleur ancrage racinaire pour plus d'efficacité



Souplesse stade et polyvalence culture

Indépendance vis-à-vis des conditions climatiques

OUTIL DIAGNOSTIC RISQUE DE VERSE : POUR RAISONNER L'EMPLOI DU REGULATEUR



Raisonner les applications et optimiser le retour sur investissement régulateur, en déterminant le risque de verse des céréales avec l'outil diagnostic risque de verse*.

*Disponible sur mobile : www.bASF-agro.fr/verse ou en flashant ce code



QU'EST-CE QUE MEDAX® TOP?

	MEDAX® TOP	
AMM	N° 2010030	
Composition	50 g/L de prohéxadione-calcium + 300 g/L de mépiquat-chlorure	
Formulation	SC	
Usages et doses autorisés	Limitation de la croissance des organes aériens. Avoine d'hiver et de printemps ; blé dur d'hiver, blé tendre d'hiver et de printemps, seigle d'hiver, épeautre, triticale, orge de printemps : 1 L/ha ; orge d'hiver : 1,5 L/ha ; colza uniquement : 1 L/ha	
Stades d'application	Céréales : entre BBCH 30 - 39 Colza : entre BBCH 13 et 20 et entre BBCH 21 et 59	
Nombre max. d'application/ ha /an	Céréales : 1/an – céréales d'hiver fractionnement possible en 2 applications Colza : Entre BBCH 13 à 20 : 1/an* - fractionnement possible en 2 applications à la dose maximale de 0,5 L/ha - intervalle maxi entre applications : 14 jours. Entre BBCH 21 à 59 : 1/an* - fractionnement possible en 2 applications à la dose maximale de 0,5 L/ha - intervalle maxi entre applications : 14 jours. * Respecter un intervalle minimum de 90 jours entre les applications.	
ZNT aquatique	5 mètres	
ZNT personnes présentes et résidents	Colza : 3 m – Céréales : 5 m	
DAR	Céréales : 56 jours – Colza : DAR F	
DRE	24 heures	
		Pour toutes informations techniques, nos experts sont à votre écoute 0 800 100 299 Service & appel gratuits
		Protection de l'utilisateur pendant la préparation de la bouillie : gants NF EN ISO 374-1 réutilisables EN16523+1/A1 (type A), EPI Vestimentaire conforme à la norme EN ISO 27065/A1, demi-masque filtrant anti-aérosol (EN 149) de classe FFP3 ou demi-masque (EN 140) avec filtre anti-aérosol (EN 143) de classe P3.
		IFBM Medax® Top est inscrit sur la liste des spécialités phytopharmaceutiques testées et acceptées sur orge de brasserie.

BASF France SAS - Division Agro – 21, chemin de la Sauvegarde – 69134 Ecully Cedex. Agrément : N° IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Débiteur d'homologation : BASF. ® Marque déposée BASF. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.agro.bASF.fr et/ou www.phytodata.com. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Vert qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Référence du document : 229MCRE0323R - Mars 2023.

Medax® Top - SGH07 - Attention H302 : nocif en cas d'ingestion - H319 : provoque une sévère irritation des yeux - EUH401 : respecter les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



SGH07

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.