




	Isard® / Spectrum®	Dakota®-P / Beloga®-P / Wing®-P	Okido®	Alabama®	Anitop®
AMM	N° 9900251	N° 2090113	N° 2190925	N° 2120075	N° 2190639
Composition	720 g/L diméthénamide-P + 250 g/L pendiméthaline	212,5 g/L diméthénamide-P + 250 g/L pendiméthaline	333 g/L diméthénamide-P + 167 g/L quinmérac	200 g/L diméthénamide-P + 200 g/L métazachlore + 100 g/L quinmérac	100 g/L diméthénamide-P + 300 g/L métazachlore + 100 g/L quinmérac
Formulation	EC (concentré émulsionnable)	EC (concentré émulsionnable)	SE (suspo-émulsion)	SE (suspo-émulsion)	SE (suspo-émulsion)
Cultures et usages autorisés	Betterave industrielle		Betteraves industrielles et fourragères	Colza (de printemps, d'hiver ou porte-graine)	Colza (d'hiver)
Dose autorisée	1 L/ha, 1 application tous les 2 ans, fractionnement obligatoire, de BBCH 12 à 18		0,3 L/ha maxi entre BBCH 10 et 12 - 0,6 L/ha maxi entre BBCH 13 et 14 - 0,6 L/ha maxi entre BBCH 15 et 18 (maximum : 1,5 L/ha)	2,5 L/ha, 1 application / 3 ou 4 ans (cf étiquette), fractionnement possible, jusqu'à BBCH 18	2,5 L/ha, 1 application / 3 ou 4 ans (cf étiquette), fractionnement possible (prélevée et post-levée du colza), jusqu'à BBCH 18
ZNT aqua (DVP) / zone non cultivée adjacente	5 m		5 m	5 m (DVP de 5 m se référer à l'étiquette) / 5 m	5 m (DVP 5 m en post-levée)
DSPPR				3 m	
DAR	90 jours		DAR F	DAR F	DAR F
DRE			48 heures	48 heures	48 heures
Cultures et usages autorisés	Chicorée à café et chicorées Witloof (productions de racines)	Tournesol			
Dose autorisée	1 L/ha, 1 application tous les 2 ans, fractionnement obligatoire, de BBCH 12 à 16	4 L/ha, 1 application / an, jusqu'à BBCH 07			
ZNT Aquatique	5 m	50 m			
ZNT plantes non-cibles		5 m			
DAR	90 jours	DAR F			
Cultures et usages autorisés	Mais doux				
Dose autorisée	1,4 L/ha, 1 application / campagne				
ZNT Aquatique	5 m				
DAR	60 jours				
Cultures et usages autorisés	Mais fourrage	Mais fourrage			
Dose autorisée	1,4 L/ha, 1 application / campagne, entre BBCH 00 et 07 et à partir de BBCH 11	4 L/ha, 1 application / an			
ZNT Aquatique	5 m	20 m			
ZNT plantes non-cibles		5 m			
DAR	90 jours	90 jours			
Cultures et usages autorisés	Mais grain	Mais grain			
Dose autorisée	1,4 L/ha, 1 application / campagne, entre BBCH 00 et 07 et à partir de BBCH 11	4 L/ha, 1 application / an			
ZNT Aquatique	5 m	20 m			
ZNT plantes non-cibles		5 m			
DAR	100 jours	100 jours			
Cultures et usages autorisés	Millet, moha, sorgho	Millet, moha, sorgho, miscanthus			
Dose autorisée	1,2 L/ha, 1 application / campagne, à partir de BBCH 13	4 L/ha, 1 application / an. À partir de BBCH 13			
ZNT Aquatique	5 m	20 m			
ZNT plantes non-cibles		5 m			
DAR	100 jours (millet, moha) 90 jours (sorgho)	100 jours (millet, moha, sorgho) 3 jours (miscanthus)			
DRE	48 heures	48 heures			



Protection utilisateur lors de la préparation de la bouillie : Gants en nitrile NF EN ISO 374-1/A1 réutilisables NF EN 16523-1+A1 (type A), EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN 27065/A1, tablier manches longues Cat. III type PB 3, lunettes de sécurité ou écran facial.

Pour toutes informations techniques,
nos experts sont à votre écoute

0 800 100 299 Service & appels gratuits

BASF France SAS - Division Agro - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. N° d'agrément : IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Débiteur d'homologation : BASF. ® Marque déposée BASF. Isard® / Spectrum® - AMM n° 9900251 - 720 g/L de dmpta-p - EC. Dakota®-P / Beloga®-P / Wing®-P - AMM n° 2090113 - 212,5 g/L dmpta-p + 250 g/L pendiméthaline - EC. Okido® - AMM n° 2190925 - 333 g/L de diméthénamide-p + 167 g/L quinmérac - SE. Alabama® - AMM : n°2120075 - 200 g/L métazachlore + 100 g/L quinmérac - SE (suspo-émulsion). Anitop® - AMM : n°2190639 - 300 g/L métazachlore + 100 g/L diméthénamide-p + 100 g/L quinmérac - SE (suspo-émulsion). Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et au www.agro.basf.fr et/ou www.phytodata.com. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° vert BASF Agro (0800 100 299) qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

© BASF - Franck Ribard - Getty Images - Shutterstock - Thinkstock - Mai 2023. Ref. n° 256MATE0523R

Isard® / Spectrum® - SGH07, SGH09 - Attention - EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. - H302 : Nocif en cas d'ingestion. - H315 : Provoque une irritation cutanée - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. - H335 : Peut irriter les voies respiratoires. - H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Dakota®-P / Beloga®-P / Wing®-P - SGH07 - SGH08 - SGH09 - Danger - EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement - H302 : Nocif en cas d'ingestion - H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires - H315 : Provoque une irritation cutanée - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Okido® - SGH07 - SGH09 - Attention - EUH208 : Peut déclencher une réaction allergique. Contient : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-benisothiazole-3-one. - EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. - H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Alabama® - SGH07, SGH08, SGH09 - Attention - EUH208 : Peut produire une réaction allergique. Contient: 2-méthylisothiazol-3(2H)-one - EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. - H351 : Susceptible de provoquer le cancer. - H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Anitop® - SGH07, SGH08, SGH09 - Attention - EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. - H351 : Susceptible de provoquer le cancer. - H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

SGH07 SGH08 SGH09

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

BASF
We create chemistry

Ensemble vers l'agroécologie

Désherbage durable avec le DMTA-P



➤ Dans le cadre de notre démarche agroécologique, nous proposons des **techniques de désherbage durables au service des filières**.

- Pour maintenir un panel important de solutions avec des modes d'action herbicides variés,
- Pour protéger les ressources en eau et en particulier les aires de captage d'eau potable.

Isard® / Spectrum® - Dakota®-P / Beloga®-P / Wing®-P
Okido® - Alabama® - Anitop®



► Le DMTA-P est un pilier majeur du désherbage pour les agriculteurs

- Mode d'action racinaire, **sécurisation de l'efficacité** du désherbage,
- **Souplesse de positionnement en maïs :** utilisation en post-semis pré-levée stricte ou en post-levée,
- **Indispensable** dans la gestion des graminées estivales (panic, sétaires, digitaires) et du ray-grass,
- **Approbation européenne** de la molécule DMTA-P jusqu'en 2034 minimum.

Notre objectif



Accompagner de manière responsable les utilisations de DMTA-P

Recommandations d'utilisation du DMTA-P

Pour tous les hectares de cultures désherbés avec du DMTA-P :
Une dose maximale de **864 g/ha/an** de DMTA-P

Cultures	Maïs, maïs doux, sorgho, millet	Betterave industrielle, chicorée	Maïs, sorgho et tournesol	Betterave industrielle et fourragère	Colza
Produits *	Isard® / Spectrum®	Dakota®-P / Wing®-P / Beloga®-P	Okido®	Alabama® Anitop®	
Dose maximale recommandée par BASF	1,2 L/ha	1 L/ha	4 L/ha	1,5 L/ha	2,5 L/ha


* ou autre produit à base de DMTA-P

Sur les aires d'alimentation des captages prioritaires :
Une dose maximale de **1152 g/ha** de DMTA-P
répartie sur 2 ans (sans dépasser 864 g/ha/an)

Mesures générales, à mettre en oeuvre quels que soient les herbicides utilisés.

- Les bonnes pratiques d'utilisation sont essentielles pour **limiter les pollutions ponctuelles**.
- Afin de préserver la qualité des eaux de surface, il est important de mettre en oeuvre un maximum de mesures pour **limiter les risques de ruissellement**.
- Maintenir la présence d'une bande enherbée de 5 m le long des cours d'eau et des plans d'eau.
- **Parcelles drainées** : il est conseillé de différer les applications en cas de risque de saturation des drains (par exemple, lorsque des fortes pluies sont prévues dans les prochaines 48h),
- Des **mesures locales spécifiques** pourront être prises sur les zones sensibles (aire d'alimentation des captages).

Pour mieux se repérer :



Quelques équivalences entre « dose de produit » et « g/ha de DMTA-P » :

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| • Isard® 0,8 L/ha = 576 g DMTA-P | • Dakota®-P 2,7 L/ha = 574 g DMTA-P |
| • Isard® 1 L/ha = 720 g DMTA-P | • Dakota®-P 4 L/ha = 850 g DMTA-P |
| • Isard® 1,2 L/ha = 864 g DMTA-P | • Alabama® 2,5 L/ha = 500 g DMTA-P |
| • Okido® 1,5 L/ha = 499,5 g DMTA-P | • Anitop® 2,5 L/ha = 250 g DMTA-P |

► Prévention des risques de pollution :

Par ruissellement



Aménager la parcelle et les zones tampons



Semer dans le sens perpendiculaire à la pente



Introduire des couverts en interculture pour améliorer la structure du sol



Utiliser des effaceurs de traces de roues lors du semis

Le saviez-vous ?

Qu'est-ce qu'un captage prioritaire ?

En 2009, les ministères du Développement Durable et de la Santé ont établi une première liste de 537 captages dits Grenelle identifiés au titre des pollutions diffuses agricoles (nitrates et phytosanitaires). Cette liste a été complétée en 2013 lors de la Conférence environnementale pour s'établir à 1 114 captages intégrés dans les plans de gestion des Agences de l'eau.

Ces captages sont pilotés par le Ministère de l'écologie pour une démarche de suivi.

Pour aller plus loin :



Le site du ministère de la Transition Écologique et Solidaire



La carte officielle des aires d'alimentation de captage.

Ou « Mes antichèches phytos » BASF



Ce système est constitué de deux éléments : un bouchon à vis prémonté sur les bidons et un connecteur autonome pouvant être fixé un trépied ou bien sur le pulvérisateur en lui-même.

Les pollutions ponctuelles

easyconnect, le Système de Transfert Fermé innovant qui facilite le remplissage des pulvérisateurs en toute sécurité.

Outre le gain de temps significatif réalisé par rapport aux méthodes d'incorporation traditionnelles, easyconnect vise un double objectif :

- Diminuer considérablement l'exposition des agriculteurs aux produits phytosanitaires,
- Réduire les impacts sur l'environnement liés aux éclaboussures ou aux déversements accidentels.

► Une démarche qui s'inscrit dans la stratégie agroécologie de BASF à horizon 2030, construite autour de 4 piliers :

- 1 - Développer un portefeuille de solutions durables répondant aux attentes des agriculteurs et des consommateurs
- 2 - Poursuivre la réduction des intrants (produits phytosanitaires, engrains, eau) grâce à l'innovation
- 3 - Réduire les impacts des produits phytosanitaires sur la santé et les ressources naturelles, en particulier la biodiversité
- 4 - Apporter notre contribution pour relever le défi climatique