



Le bon programme fongicide

- L'association de **SCALA** et **TOPSIN** constitue une solide barrière contre les maladies des pois écosés.
- **SCALA** et **TOPSIN** agissent préventivement pour une lutte fongicide hautement efficace.
- Les clés de la réussite du programme :
 - des spectres d'activité complémentaires
 - une alternance de matières actives

Pour traiter **3,3 ha de pois** :

5 litres de SCALA

(1 bidon de 5 l)

6 litres de TOPSIN

(1 bidon de 5 l et 1 bidon de 1 l)



9 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION

- 1 ▶ Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé. ✓
- 2 ▶ Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi. ✓
- 3 ▶ Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes). ✓
- 4 ▶ Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application. ✓
- 5 ▶ Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse). ✓
- 6 ▶ Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor. ✓

PENDANT L'APPLICATION

- 7 ▶ Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments. ✓

APRÈS L'APPLICATION

- 8 ▶ Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle. ✓
- 9 ▶ Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche. ✓

CONDITIONS D'EMPLOI :

- Port de gants obligatoire pour les opérateurs pendant toutes les opérations de traitement.
- Distance aux points d'eau : respecter une zone non traitée (ZNT) minimale de 5 m.



BASF Agro S.A.S
21, chemin de la Sauvegarde
69134 ECULLY Cedex
Tél. 04 72 32 45 45
Fax 04 78 34 26 86
www.basf-agro.fr



CERTIS
5, rue Galilée
78280 GUYANCOURT
Tél. 01 34 91 90 00
Fax 01 34 91 90 09
www.certiseurope.fr

Je vais le dire à ma mère...

CONTRE LES MALADIES DES POIS ÉCOSÉS

Vous avez tous les atouts en main !



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI

Nov 07 • SCALA : N° AMM : 9200159 - pyriméthanol 400 g/l - marque déposée BASF. N-R51 : dangereux pour les organismes aquatiques. R53 : peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE AVANT TOUTE UTILISATION. TOPSIN : AV n°9700425. Thiophanate-méthyl 450 g/L. Xn - Nocif. © Marque déposée Nippon Soda Co Ltd. Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation.

Il faut agir au bon moment...

La nuisibilité du complexe parasitaire des pois de conserve (botrytis, sclérotinia, anthracnoses) nécessite une lutte fongicide préventive adaptée.



Crédit photos : BASF

Cette lutte se construit en programme, avec un premier passage début floraison, suivi d'un second 10 à 15 jours après.

Le traitement début floraison est la clé de la réussite, il doit donc être soigneusement raisonné.



...en associant les deux fongicides qui se complètent le mieux

Pour permettre une protection fongicide polyvalente de haut niveau, l'association SCALA® + TOPSIN® est particulièrement adaptée :

- champs d'activité complémentaires
- combinaison de deux substances actives à modes d'action différents : pyriméthanil et thiophanate-méthyl

SCALA®

- Fongicide à base de pyriméthanil
- Contact et translaminaire
- A l'abri du lessivage

Usages : • pois : botrytis, anthracnoses
• haricots : botrytis

Conditionnement : bidons de 1 et 5 litres

Formulation : suspension concentrée

Dose autorisée : 1,5 l/ha

Délai d'emploi avant récolte : 14 jours

Délai de rentrée : 6 heures (8h sous abri)



TOPSIN®

- Fongicide systémique à base de thiophanate-méthyl
- Pénétrant et translaminaire
- Action préventive et curative

Usages : • pois : pourriture grise

Conditionnement : bidons de 1, 5 et 20 litres


Formulation : suspension concentrée

Dose autorisée : 1,8 l/ha

Délai d'emploi avant récolte : 14 jours

Délai de rentrée : 6 heures (8h sous abri)

SCHEMA DE POSITIONNEMENT



¹Intervenir préventivement, au tout début de la floraison (premiers pétales visibles) en veillant à la qualité de la pulvérisation