

■ Pourquoi CELTIC ?

Dans un marché automne avec de nouvelles restrictions sur l'usage de certaines familles chimiques, CELTIC est plus que jamais indispensable car :

CELTIC sur céréales, c'est :

- **un spectre dicot large**
- **doublé d'un effet graminicide**
- **un mode d'action différent** des fops, des sulfo, des urées...

■ Qu'est-ce que CELTIC ?

- **Mode d'action** : CELTIC agit par inhibition de la division cellulaire des méristèmes des feuilles et des racines des jeunes plantules (Pendiméthaline) et par inhibition de la synthèse des caroténoïdes des dicotylédones (Picolinafen).
- **Composition** : 16 g/L picolinafen + 320g/L de pendiméthaline.
- **Formulation** : Suspension concentrée.
- **Classement** : N-Xi-R43-R50/53 - ZNT : 20 mètres
- **DAR** : céréales 90 j
- **Délai de rentrée** : 48 heures
- **Dose autorisée** : 2,5 L/ha sur blé tendre et blé dur d'hiver, orge d'hiver, seigle, triticale.

■ Comment s'utilise-t-il ?

CELTIC s'utilise en post-levée précoce dès 1 feuille vraie de la céréale.

→ Préconisations sur Blé et Orge d'hiver

- **Utilisation associé** : de 2 L à 2.5 L/ha selon la flore mixte graminées – dicots (voir au verso)
- **Utilisation seul** : de 2 L à 2.5 L/ha sur une large flore « dicots » et sur paturins


	Celtic 2.5 l/ha
Aethusa	MS
Alchemille	S
Capselle	TS
Coquelicot	TS
Fumeterre	S
Gaillet	MS
Geranium	TS
Lamier	TS

	Celtic 2.5 l/ha
Matricaire	MS
Myosotis	TS
Pensée	TS
Colza	S TS
Renouées	S
Sanvès	TS
Stellaire	TS
Véroniques	TS

	Celtic 2.5 l/ha
Folle Avoine	R
Agrostis	S TS
Paturins	S TS
Raygrass	R
Vulpin	MS

Herbicides céréales

BASF
The Chemical Company



■ CELTIC + Ductis

- **Période d'utilisation** : automne en post-levée précoce

- **Stades d'application** :

- de la céréale : dès le stade 1-3 feuilles
- des adventices :
 - dicotylédones : levées à 6 feuilles
 - graminées : levées à 3 feuilles

- **Doses** :

Celtic 2 à 2,5 L/ha + Ductis 15 g/ha

(adapter les doses en fonction de la pression adventices)

	Celtic 2 L/ha + Ductis 15 g/ha
Alchemille	S
Capselle	TS
Coquelicot	TS
Fumeterre	S
Gaillet	S
Geranium	TS
Lamier	TS

	Celtic 2 L/ha + Ductis 15 g/ha
Matricaire	TS
Myosotis	TS
Pensée	TS
Colza	TS
Renouées *	TS
Sanves	TS
Stellaire	TS
Véroniques	TS

	Celtic 2 L/ha + Ductis 15 g/ha
Agrostis	TS
Paturins	TS
Raygrass	R MS
Vulpin	TS

*stade jeune 2F

Ductis® : marque déposée DuPont. Autorisation de vente n°2010281. Composition : 50% de flupyrifluron-méthyle. Classement : non classé. R50-R53.

■ CELTIC + IPU

- **Période d'utilisation** : automne en post-levée précoce

- **Stades d'application** :

- de la céréale : à partir de 2-3 feuilles
- des adventices :
 - dicotylédones : levées à 6 feuilles
 - graminées : levées à 3 feuilles

- **Doses** :

Celtic 2 à 2,5 L/ha + IPU 2,4

(adapter les doses en fonction de la pression adventices)

	Celtic 2 L/ha + IPU 2,4 L/ha
Alchemille	S
Capselle	TS
Coquelicot	TS
Fumeterre	S
Gaillet	MS
Renouées	S
Sanves	TS
Stellaire	TS
Véroniques	TS

	Celtic 2 L/ha + IPU 2,4 L/ha
Matricaire	TS
Myosotis	TS
Pensée	TS
Colza	S TS
Renouées	S
Sanves	TS
Stellaire	TS
Véroniques	TS

	Celtic 2 L/ha + IPU 2,4 L/ha
Agrostis	TS
Paturins	TS
Raygrass	MS S
Vulpin	S